

Ueber

Zerreissung der Gebärmutter.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Hrn. Universitätsprofessors, Obermedizinal- und Hofrathes

Dr. von Hecker,

Directors der hiesigen Gebäranstalt,

der medizinischen Fakultät zu München vorgelegt

von

Eugen Hug,

prakt. Arzt.

München, 1878.

Königliche Hof- und Universitäts-Buchdruckerei
von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Ueber

Zerreissung der Gebärmutter.



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präfidium

des Hrn. Universitätsprofessors, Obermedizinal- und Hofrathes

Dr. von Hecker,


Directors der hiesigen Gebäranstalt,

der medizinischen Fakultät zu München vorgelegt

von

Eugen Hug,

prakt. Arzt.



München, 1878.

Königliche Hof- und Universitäts-Buchdruckerei
von Dr. C. Wolf & Sohn in München.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Ruptura uteri.

Die Zerreiſung der Gebärmutter iſt ein, wenn auch glücklicher Weiſe feltenes doch in mancherlei Hinſicht für den geburtshülſliche Praxis ausübenden Arzt höchwichtiges Ereigniß, indem es ja jedem ſelbſt bei einem kleinen dieſsbezüglichen Wirkungskreiſe vorkommen kann, und bloß in der Abſicht, ſelbſt daraus Nutzen zu ziehen für meinen künftigen Beruf als Arzt, machte ich mich daran, die neueſte einſchlägige Literatur und die Präparatenſammlung der hieſigen Entbindungsanſtalt in dieſer Richtung einem eingehenderen Studium zu unterwerfen. Es wäre ja ein ziemlich kühnes Unternehmen, etwas Neues in dieſem Betreffe bieten zu wollen, nachdem in neuerer Zeit auf ſo ausgezeichnete Weiſe von Spiegelberg und Bandl ſowohl der phyſiologiſche Geburtshergang bei normalem wie abnormen Becken als auch die möglichen pathologiſchen Ereigniſſe in Rückſicht auf vorliegendes Thema beleuchtet worden ſind.

Mein Plan iſt alſo, mir ſelbſt über das Zuſtandekommen der Gebärmutterzerreiſung beſtimmte Fragen vorzulegen, ſie an der Hand genannter wie auch anderer Autoren zu beantworten und geſtützt auf eine Anzahl in hieſiger Klinik und Poliklinik vorgekommener Fälle, deren Beſchreibung mir von meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Obermedizinalrath Profeſſor Dr. von Hecker überlaſſen wurde, zu erläutern.

Die Kenntniß von der Ruptur des Gebärgorganes reicht wohl nicht über das Ende des 17. Jahrhunderts hinauf, und treten uns die erſten etwas unſicheren Angaben darüber entgegen in unverkennbarem Zuſammenhange mit der auch um dieſe Zeit auftauchenden Lehre vom engen Becken.

Mauriceau, Deventer und De la Motte sind diejenigen Autoren, bei welchen sich die ersten Erwähnungen über dasselbe finden; die nämlichen erwähnen dabei auch der Zerreiſſung der Gebärmutter, deren direkte Veranlassung sie aber noch ableiten von den stürmischen Bewegungen des Kindes. Mehr Licht kam in die Sache durch die Arbeiten von Levret und Smellie über das enge Becken und durch das vortreffliche Werk von Baudelocque „L'art des accouchement“, in dem der Verfasser den Bewegungen des Kindes keinen Einfluß mehr auf das Zustandekommen der Ruptur beimisst, sondern das Ereigniß ableitet von partiellen Schwächungen des Gewebes durch lange Dauer des Geburtsherganges in Folge übler Bildung des Beckens oder übler Stellung des Kindes resp. kindlichen Kopfes. Auch gibt er schon an, daß die Ruptur stets eintrete auf der Höhe der Wehe, und ein gesunder Uterus ebenso gut zerreißen könne wie einer, der durch lokale Erkrankung dazu disponirt sei.

Im 19. Jahrhundert finden wir bei B. F. Oslander die werthvollsten Angaben über dieses Kapitel; er gibt an, daß von den Rissen, die als Gebärmutterrisse beschrieben seien, viele Vaginalrisse seien, wobei er jedoch Scheide und Gebärmutterhals nicht auseinander zu halten weiß; er erwähnt auch besonders der durch operative Eingriffe, namentlich durch die Wendung auf die Füße bedingten violenten Ruptur der Gebärmutter. In gleicher Weise äußert sich L. F. Boër, der auch das enge Becken als Ursache der Zerreiſſung betont. A. Elias von Siebold differenzirt ausdrücklich die completen und incompleten Rupturen und macht auf die Schwierigkeit der Diagnose bei letzteren aufmerksam. *)

Gehen wir nun auf die Anschauungen der neueren und neuesten Zeit über dieses Thema ein, so finden wir die Meisten darin einig, daß es sich dabei um ein räumliches Mißverhältniß — also enges Becken, abnorme Fruchstellung, ungewöhnliche Größe des kindlichen Kopfes — handle; doch

*) Diese kurzen historischen Notizen sind der Einleitung zu der Monographie von Dr. L. Bandl über „Ruptur der Gebärmutter“, Wien 1875, entnommen.

ebenso constant tritt uns die Ansicht wieder entgegen, daß dies allein nicht hinreiche zum Zustandekommen einer Ruptur, sondern es müsse nebenbei auch eine Prädisposition des Uterusgewebes bestehen. Schröder sagt in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe 1874: „Sehr selten kommen Querrisse am Cervix bei normalem Gewebe vor“ und an einer andern Stelle: „Die akut entstehenden perforirenden Uterusrupturen treten vielleicht niemals bei vollständig gesundem Uterusgewebe auf; zu ihrem Zustandekommen gehört eine Prädisposition des Gewebes und eine veranlassende Ursache“ und werden schwach entwickelte Stellen an einem sonst normalen Uterus, Unterbrechungen des normalen Gewebes durch interstitielle Fibrome, Narben, entzündliche Erweichung u. s. w. als disponirende Momente angeführt. In der neuesten Auflage seines Lehrbuches der Geburtshilfe von 1877 schließt sich jedoch Schröder der Anschauung Bandl's über die Antilogie der Cervixrupturen an, welche weiter unten entwickelt werden wird.

Für die Rupturen des unteren Uterinsegmentes gibt v. Scanzoni *) als vorzüglichste Urfachen an jene Momente, welche der regelmäßigen Erweiterung der Muttermundsoeffnung hindernd in den Weg treten und bei den fortwährend an Intensität zunehmenden Contractionen des Uterusgrundes und Körpers eine übermäßige Ausdehnung und Verdünnung des vom vorliegenden Kindestheile herabgedrängten unteren Gebärmutterabschnittes bedingen — wie spastische Strikturen der Muttermundsoeffnung, Narbengewebe, krebfige Infiltration. Als weitere Urfachen der Ruptur im unteren Uterinabschnitte führt er die durch Ufur herbeigeführten Defekte an, erzeugt durch ein scharfes Promontorium, scharfkantige Schambeine, flachelförmige Exostosen u. s. w. Es ist dabei der Einfluß des engen Beckens ganz außer Acht gelassen und da, wo seiner Erwähnung geschieht, wird ihm nur insofern ein Einfluß zu-

*) Dr. Fr. W. v. Scanzoni — Lehrbuch der Geburtshilfe, III. Auflage 1855, Seite 448 und IV. Auflage 1867, Seite 219.

geschrieben, als das Gebärgorgan durch das dem Austritte des Foetus entgegenstehende Hinderniß zu heftiger Expulsionsthätigkeit angeregt wird, wo es dann bei dazu günstiger Beschaffenheit des Parenchyms des Uterus zur Ruptur kommen kann. Durch die maßgebenden Arbeiten von Bandl*) und Spiegelberg**) in der allerneuesten Zeit wurde die Frage über Aetiologie der spontanen Gebärmutterruptur wohl endgültig entschieden, und werde ich auf beide zurückkommen bei Beantwortung der einen oder der anderen der Fragen, die wir uns hier stellen wollen:

- 1) Begriff der Gebärmutterruptur?
- 2) Urfächliche und begünstigende Momente dabei?
- 3) Sitz der Ruptur, speciell kommt auch eine Ruptur im fundus uteri spontan vor?
- 4) Diagnose, Prognose und Therapie?
- 5) Bedeutung der Ruptur in forensischer Beziehung?

ad 1) Wenn wir von Gebärmutter-Zerreißung sprechen, so meinen wir hier diejenigen Fälle von Ruptur, welche während der Geburt passiren, und scheiden davon sogleich diejenigen Verletzungen des Gebärgorganes, welche als Phänomene lange dauernden partiellen Druckes in stellenweiser Mortifikation des Uteringewebes auftreten; insoferne von ihnen aus jedoch eine spontane Zerreißung des Uterus ihren Ausgang nehmen kann, werden wir sie beiziehen. Nach dieser Ausscheidung bleibt uns noch eine Differenzirung übrig, indem aus anatomischen Gründen die Ruptura uteri completa s. perforans und die Ruptura uteri incompleta s. non perforans unterschieden wird.

Die complete Uterusruptur ist gegeben, wenn das Parenchym der Gebärmutter nebst dem Bauchfell-Ueberzug durchbrochen ist, also die Bauchhöhle mit der Gebärmutterhöhle durch die Rißstelle communicirt — dabei ist die Möglichkeit gegeben, daß die Frucht in der Uterushöhle ganz oder theilweise verblieben oder total in die Bauchhöhle aus-

*) Dr. L. Bandl, über „Ruptur der Gebärmutter“. Wien 1875.

**) Otto Spiegelberg, Lehrbuch der Geburtshülfe. Breslau 1878.

getreten ist. Der Riß zeigt meist etwas zerfetzte Ränder und häufig die Eigenthümlichkeit, daß der Peritonealüberzug nicht in gleicher Höhe und Ausdehnung mit dem Parenchymriße durchgetrennt ist — es ist dies natürlich nur da möglich, wo das Bauchfell nicht wie am Corpus und Fundus innig mit dem Parenchym verwachsen ist, also namentlich an den Seitenrändern, an denen sich die breiten Mutterbänder ansetzen.

Man findet ziemlich häufig bei entsprechendem Sitze der Continuitätstrennung Abhebungen des Peritoneums in bedeutender Ausdehnung, deren Entstehung so zu erklären ist, daß bei einer allmählig sich vervollständigenden Ruptur Blut, vielleicht auch ein Kindestheil, sich zwischen Uterus-substanz und Bauchfell fortwühlte, bis schließlic in Folge gesteigerten Druckes, etwa durch die Blutanfammlung selbst oder eine eintretende Wehe, auch die letzte Hülle fällt und die Kommunikation zwischen Uterus- und Bauchhöhle hergestellt ist. In seltenen Fällen jedoch kommt es nicht zur Zerreißung des Peritonealsackes und wir haben dann die *Ruptura uteri incompleta*; es ist dies letztere selten und hat wohl nur dann statt, wenn die Frucht nicht aus der Gebärmutterhöhle ausgetreten ist; doch sind zwei Fälle — einer von Dalton, ein anderer von Radford — in der Literatur verzeichnet, in denen das Kind vollständig in den unverfehrten Bauchfellsack geboren wurde. Eine Modifikation der incompleten Ruptur ist die, wobei blos der Bauchfellüberzug eingerissen ist, also die *Ruptura uteri incompleta peritonealis s. externa*.

ad 2) Fragen wir uns, „warum reißt der Uterus?“ so ist die Antwort: Der Uterus hat, nachdem das Ende der Schwangerschaft erreicht ist, auf Grund gewisser regressiver Metamorphosen das Bestreben sich seines Inhaltes zu entledigen — und daß er hiebei einer ganz bedeutenden Kraftleistung fähig ist, sehen wir an den Fällen, wo bei ziemlich bedeutender Beckenverengerung dennoch durch die alleinige Kraft des Uterus die Geburt erfolgt ist —; treten jedoch Momente ein, die mehr verlangen als das Gebärorgan zu

leisten vermag, so prägen sich dieselben aus entweder in einer Erkrankung und Erlahmung, oder in dem Effekte einer Selbstzerreißung des austreibenden Organes, und zwar wird es an der Stelle reißen, die den geringsten Widerstand bietet. Es ist also einleuchtend, daß Stellen, die in ihrer Masse verdünnt oder degenerirt sind, bevorzugt werden; derlei Zustände begegnen uns in Form von Narben früherer Continuitätstrennungen, interstitiellen Fibroiden, fettiger Entartung u. f. w.; wir dürfen jedoch diese genannten Zustände nur als das Zustandekommen der Ruptur begünstigende Momente auffassen, indem sicher ebenso gut ein Uterus mit solchen schwachen Stellen eine normale Geburt zu Stande bringen als ein vollkommen gesunder Uterus reißen kann.

Die Ursachen der Zerreißung müssen wir einzig und allein in dem räumlichen Mißverhältnisse suchen und dies kann gegeben sein sowohl von Seite der Mutter als des Kindes, es handelt sich also um Beckenverengerung oder abnorme Gröfse, wohl auch starke Verknöcherung des kindlichen Schädels — Hydrocephalus — abnorme Stellung des Kindes resp. kindlichen Kopfes.

Was geschieht nun, wenn eines dieser mechanischen Hindernisse gegeben ist? Die Kraftäufserung des Uterus reicht nicht hin, obschon sie bei engem Becken sogar eine gesteigerte zu sein pflegt, die Geburt zu beenden, id est die ungewöhnlichen Hindernisse zu überwinden. Wir müssen hier etwas weiter ausholen und den Vorgang der Geburt unter normalen Verhältnissen ins Auge fassen und lasse ich hier Bandl reden, der in seiner Monographie über Gebärmutterruptur diese Verhältnisse bespricht: „Daß der Cervix „sich bei der Geburt passiv verhält und wie ein elastischer „Schlauch durch den eindringenden Kopf länger und weiter „wird, ist von vielen Autoren längst behauptet worden und „durch den von Braune*) meisterhaft ausgeführten Durch- „schnitt der Leiche einer gebärenden Frau zu einem fest-

*) Braune, Topogr. anatom. Atlas, Supplement-Tafel c und Schröder's Lehrb. d. Geburtshilfe, 1874. pag. 140.

„stehenden Faktum geworden. Bis zu der Geburtsphase, „wo der Kopf vollkommen vom Cervix aufgenommen ist, „ist das Verhalten der Weichtheile klar, aber wie der Cervix „über den Kindskopf hinauf kommt, über den Uebergang „von Eröffnungsperiode zur Austreibungsperiode finde ich „nirgends klare Angaben. Wenn man sich die Verhältnisse „vor Augen hält, so gibt es dafür keine anderen maßgebenden Faktoren als die Muskelkraft des Uterus und die „Elasticität des Cervicalgewebes selbst. Der Cervix wird „bei den Contractionen des Uterus nach und nach über den „Kopf hinaufgezogen und wenn das Ostium externum einmal in der Nähe der größten Schädelperipherie ist, mag „auch seine Elasticität eine untergeordnete Rolle spielen“.

Durch die Lig. teres und die Bauchmuskulatur wird nämlich der Uterus fixirt, und da der Uterus mit seinem Ostium internum im Beckeneingang steht, so sind jetzt die bestmöglichen Bedingungen für seine erfolgreiche Kraftentwicklung gegeben; diese Stellung des Os internum in der Höhe des Beckeneinganges ist bei normaler Geburt constant, und nun wird durch die Wehenthätigkeit mittelst des vorliegenden Theiles der Cervix ausgedehnt. Ist die Ausdehnung erreicht, also der Kopf in den Cervicalschlauch eingetreten, so beginnt jetzt der zweite Theil der Arbeit: der Cervix muß über den Kopf zurück- oder emporgezogen werden, was durch die Contractionen des Uterus geschieht, der von den runden Mutterbändern und der Bauchmuskulatur wieder fixirt und kräftig unterstützt wird. Treten nun mechanische Geburtshindernisse ein, so kann eine Steigerung dieser eigentlich normalen Cervixdehnung und Verdünnung, die ausgesprochen ist in einem bedeutenden Hinausrücken des inneren Muttermundes über das Niveau des Beckeneinganges, zu dem ominösen Ereignisse einer Ruptur führen. Liegt nämlich eine Beckenverengerung vor, so bemüht sich der Uterus mit Adnaxis und der Bauchpresse das Hinderniß zu überwinden; endlich jedoch erlahmen die Bauchpresse und die runden Mutterbänder, die Fixation des Uterus auf den Beckeneingang wird aufgehoben, der Uterus zieht sich in

Folge der andauernden Wehen mehr und mehr über die Frucht zurück, das Ostium internum steigt über den Beckeneingang auf, wird ausgedehnt und es findet eine theilweise Geburt der Frucht in den Cervix statt; da aber dem Austritte des vorliegenden Kopfes in der Beckenverengung ein Hinderniß entgegensteht, so erfahren Cervix, wohl auch Scheide, eine abnorme Dehnung in die Länge, so daß es nur mehr einer geringen Veranlassung, wie eines heftigeren Wehenstoßes, ja nicht einmal dieser, oder einer gewaltsamen Inhaltsvermehrung — wie durch Einführung der Hand des Operateurs — bedarf, um zu zerreißen, und so kommen wir auf die Eintheilung der Ruptur, die sich aus der Betrachtung ihrer Ursachen ergibt, in eine Ruptura uteri spontanea und violenta.

Auch die vorzeitige Anwendung der Bauchpresse wird beschuldigt, daß sie das Zustandekommen der Ruptur befördere. Schurlau *) sagt hierüber: „Ein Hauptmoment für „das Zustandekommen der Ruptur scheint mir das nachweisbar willkürliche Mitpressen der Kreißenden vor völliger „Erweiterung des Muttermundes zu sein, wodurch der Mutterhals einer andauernden Quetschung zwischen Promontorium „und Kindskopf unterworfen wurde“. Er veröffentlicht einen diesbezüglichen Fall und führt dabei an: „Kräftige Wehen „waren nach Aussage der Hebeamme und des Praktikanten „nicht vorhanden, ebenso lautete die Aussage der Verstorbenen, vielmehr soll dieselbe ohne Wehendrang, lediglich „in der Hoffnung, die Geburt zu beschleunigen, willkürlich „die Bauchpresse haben wirken lassen“, es sei übrigens ein allgemein verengtes Becken mit einer Conj. vera von 8,5 Ctm. gewesen. Es ist jedoch kaum glaublich, daß ein Cervix, der nicht durch vorhergegangene kräftige Wehen in den für eine spontane Ruptur erfordernden Zustand der Verdünnung und Ausziehung gebracht worden ist, bloß durch Anwendung der Bauchpresse ab- oder durchgerissen ist, um so weniger, da ja kaum der Kopf in den Cervix eingetreten

*) Monatschrift f. Geburtskunde 29. B. Jahrgang 1867.

fein wird bei der, wie es oben heisst, unzureichenden Wehenthätigkeit. Man müsste für diesen Fall annehmen, dass durch den vielleicht lange Zeit schwer vorliegenden kindlichen Schädel der Cervix zur lokalen Ufur geführt wurde und von der ufurirten Stelle aus eine Ruptur zu Stande kam, wobei die Annahme der stark wirkenden Bauchpresse als Grund der Ruptur gelten mag.

Vielseitig wird auch die bedeutendere Entwicklung der Muskelfsubstanz des Grundes und Körpers als Veranlassung der Ruptur angeführt, indem das Cervicalgewebe nicht den nöthigen Widerstand zu leisten vermöge, wenn das hypertrophische Organ seine Thätigkeit beginne. Es ist Thatfache, dass manche zerrissene Gebärmutter eine abnorme Entwicklung ihres Muskelstratum zeigt und für die Fälle, welche eine anderweitige Erklärung nicht zulassen, mag auch sie als mögliche Urfache ihre Berechtigung haben; doch sind dies gewiss die allerwenigsten Fälle.

Es ist, wie gesagt eine nicht seltene Erscheinung, dass man auf eine solche gesteigerte Entwicklung der Muskelschichte trifft, doch hat dies seine guten Gründe. Die Messungen von Bandl ergeben, dass der Uterus Mehrgebärender im Durchschnitte grösser ist als der Erstgebärender, und führt er diese Verhältnisse ganz richtig auf die wiederholte und durch räumliche Missverhältnisse erschwerte Geburtsarbeit zurück, was auch ganz plausibel klingt, wenn man erwägt, dass jedes viel thätige Organ, jeder viel in Anspruch genommene Muskel unseres Körpers einer besonderen Entwicklung sich erfreut.

Wir kommen also hier wieder darauf hinaus, dass die gesteigerte Entwicklung der Muskellagen des Uterus eine Folge eines anderen Zustandes, nämlich des räumlichen Missverhältnisses ist.

Auch möchte man fragen, warum bei sonst normalen Verhältnissen ein in seiner Muskelfsubstanz hypertrophischer und dadurch leistungsfähigerer Uterus zur Zerreissung des normalen Cervix und nicht eher zu dessen Erweiterung, resp. zu dem physiologischen Effekte der Geburt führen

folgte, in der Weise, daß die Geburtsarbeit eben in kürzerer Zeit zu Stande käme.

ad 3) Die Ruptur kann ihren Sitz haben im Halstheile, Corpus und Fundus. Das Gewöhnliche ist allerdings der Sitz des Risses im Cervix, der sich von hier aus nach oben in die Uterussubstanz fortsetzen kann in longitudinaler oder schräger Richtung; auch Querabtrennungen des Halstheiles von dem Uteruskörper sind nicht selten. Daß jedoch auch spontane Rupturen im Fundus vorkommen können, ohne daß eines der oben angeführten die Ruptur begünstigenden Momente nachzuweisen wäre, zeigt ein Fall, der hier zur Beobachtung kam und später beschrieben werden wird.

Schließlich kommen wir noch zu sprechen auf die Rupturen, die ausgehen von Stellen, die durch lange dauernden Druck, den sie erleiden von hervorragenden Knochenpartien, wie sie in Form eines scharfen Promontoriums, eines scharfen Schambeinkammes oder stachelförmiger Exostosen beobachtet werden, brandig abgestorben, ulcirt sind; es spielt bei Entstehung dieser lokalen Ulcer jedenfalls auch der kindliche Kopf eine Rolle, welcher als gleichfalls harter Körper die betreffende Uteruspartie gegen die Knochenvorsprünge drückt und zur Verschorfung bringt. Daß von solchen Defekten der Gebärmuttersubstanz eine weitere Ausbreitung der Continuitätstrennung bei Hinzutritt der nöthigen ätiologischen Momente erfolgen kann, ist einleuchtend.

ad 4) Ist die Ruptur eingetreten, so wird ihre Erkenntniß auch kaum Schwierigkeiten machen, wenigstens was die perforirenden Uteruszerreißungen anbelangt. Die Kreissende selbst, die vorher in kräftigen Wehen gelegen war, äußert vielleicht laut eine Schmerzempfindung, gibt wohl auch an, es sei ihr etwas im Leibe geborsten; auf dem Antlitze der Patientin prägt sich oft momentan das verhängnißvolle Ereigniß aus, das Gesicht erblaßt, collabirt, es können auch vorübergehende Ohnmachten eintreten; der Puls wird klein frequent, die Wehen cessiren mit einem Schlage, in den meisten Fällen findet Blutabgang aus den Genitalien statt, und eine nun vorgenommene Untersuchung

wird Gewissheit verschaffen. Bei der Palpation des Unterleibes sind die verschiedenen Kindestheile durch die Bauchdecken durchzufühlen, außerdem wird man auf einen grossen kugeligen Körper stossen, den contrahirten Uterus, der nach einer Seite oder auch nach oben ausgewichen ist — die kindlichen Herztöne sind verschwunden. Bei der inneren Untersuchung wird man, wenn totaler oder partieller Austritt der Frucht in die Bauchhöhle stattgefunden hat, keinen vorliegenden Theil mehr finden, auch wird man in den meisten Fällen leicht an die Rißstelle gelangen können. Weniger prägnant sind die Symptome, wenn es sich um unvollständige Rupturen handelt, oder wenn bei vollständiger Ruptur ein Austritt des Kindes nicht statt hat. Das Symptom der Blutung wird fehlen, da der vorliegende Theil den Blutabgang hindert — die Erscheinungen die aus dem Fruchtaustritte in die Bauchhöhle resultiren, fehlen natürlich; indess werden die subjectiven Angaben der Kreissenden, der Collaps derselben, wie die vollständig aufhörenden oder doch schwächer und feltener werdenden Wehen die Vermuthung auf Ruptur wache rufen.

von Hecker äussert sich in der Monatschrift für Geburtskunde, Band 31 Jahrgang 68 zur Symptomatologie der unvollkommenen Gebärmutter-Zerreissung: „Auch die so charakteristische Funktionsstörung des Uterus bei der Ruptura uteri completa, das gänzliche Aufhören oder wenigstens starke Darniederliegen der Wehenthätigkeit vermissen wir hier. Da die Einreissung in den allermeisten Fällen in der Nähe der Portio vaginalis und seitlich, da wo das Bauchfell nicht so straff anliegt, erfolgt, so bleiben die longitudinalen Muskeln in Thätigkeit und man beobachtet bis zum letzten Momente oder bis zu der künstlichen Entbindung eine regelmässige, wenn auch schwächere und nicht eigentlich expulsive Wehenthätigkeit. Bei dem Verhalten des Gesamttorganismus endlich ist hervorzuheben, dass die ominöse Veränderung der Gesichtszüge, der schnelle Collaps, das Gefühl als ob etwas im Unterleibe geborsten sei, genug die Erscheinungen, die wir bei der vollständigen

„Ruptur mehr oder minder deutlich ausgeprägt zu sehen
 „gewohnt sind, hier sehr wenig oder gar nicht aufzutreten
 „brauchen, daß namentlich das subjective Befinden mitunter
 „ein so gutes ist, daß hiedurch sehr leicht zu Täuschungen
 „Veranlassung gegeben wird; nur ein Symptom habe ich
 „bis jetzt nie vermisst und glaube ich demselben eine große
 „Bedeutung vindiciren zu müssen, das ist, daß ebenso wie
 „bei der Ruptura uteri completa der Puls schon frühe, schon
 „bei Beginn der Einreißung frequent und klein wird, eine
 „Veränderung, die dann mit der eben erwähnten Euphorie
 „in einen bedenklichen Widerspruch tritt“.

So werthvoll nun dies letztere Symptom ist, so ist es doch auch nicht ganz verläßig, weil es auch mitunter fehlen kann, wie der klinisch beobachtete Fall 5) zeigt. In der betreffenden Krankengeschichte heisst es: „Das Auffällige
 „beim ganzen Vorgange war, daß die Person keine Schmer-
 „zensäußerung gemacht; in ihrem Pulse trat keine Verän-
 „derung ein — 88 Schläge in der Minute“. Indefs combinirt mit den übrigen Erscheinungen wird die Pulsbeschaffenheit bei Beurtheilung zweifelhafter Fälle von Ruptur ein höchwichtiges Moment bleiben.

An derselben Stelle führt von Hecker ein weiteres Symptom für die incomplete Ruptur an, das, wenn vorhanden, gewiss sehr werthvoll ist; ich meine die von Hecker zuerst beschriebene Haematocele anteuterina extraperitonealis, welche gebildet wird durch Bluteintritt in das Zellengewebe zwischen Harnblase und vorderer Uterus- resp. Scheidenwand und welche in zwei höchst interessanten Fällen von Hecker beobachtet wurde, die in der genannten Schrift veröffentlicht sind — durch die Constatirung ihres Vorhandenseins war die Diagnose der Uterusruptur gegeben; es scheint jedoch das Ereigniß ziemlich selten zu sein, wie ja überhaupt die incomplete Ruptur. Was gibt es nun für Anhaltspunkte für eine drohende Ruptur? Da haben wir zunächst wieder das subjective Befinden der Kreissenden: sie befinden sich in ungemeiner Aufregung, quälende Angst vor dem, was kommen soll, befallt sie und sie äußern dieselbe auch gegen

ihre Umgebung, bitten, man möge sie entbinden, wozu sie wohl auch durch die in den meisten Fällen äußerst heftigen und schmerzhaften Wehen veranlaßt werden, sie werden uns ferner sagen, daß sie schon früher schwere Geburten durchgemacht, daß sie durch die Zange, durch Wendung u. d. w. entbunden wurden. Dadurch zu einer objektiven Untersuchung aufgefordert, werden wir in den meisten Fällen das hauptsächlich ätiologische Moment für die Ruptur, ein enges Becken constatiren können, das sich äußerlich in einem prononcirten Hängebauch und in den Fällen von Rachitis auch in der allgemeinen Körperconstitution wenigstens häufig ausprägt — Mindermaß des Körpers, Verkrümmung der Wirbelsäule, der Oberschenkelknochen. — Eine Beckenmessung, wobei wir vielleicht auch einen mangelhaften Eintritt des vorliegenden Theiles in den Beckeneingang constatiren können, wird die Vermuthung auf Verengerung bestätigen. Das räumliche Mißverhältniß in Verbindung mit den heftigen Wehen haben zu einer bedeutenden Verdünnung und Verlängerung des Halstheiles geführt, die einer genauen Manualexploration nicht entgehen wird. Bei der äußeren Untersuchung wird uns noch mitunter auffallen, daß die Kindestheile ungemein deutlich durch die Bauchdecken durchzufühlen sind, und nahm man hier eine physiologische Verdünnung der Uteruswand an (Kiwisch).

Bandl hat jedoch nachgewiesen, daß die so leicht durch die Bauchdecken fühlbaren Kindestheile nicht von verdünnter Uteruswand, sondern von Cervixwand bedeckt waren. Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch vernachlässigte Schulterlagen, welche eine ungleichmäßige Dehnung des Cervix bedingen, sehr verdächtig sind.

Ist eine Ruptur gegeben, so sind damit zwei Menschenleben in höchstem Grade gefährdet. Wenn die Entbindung nicht sofort stattfindet, so stirbt das Kind ab, indem sich die Placenta ablöst. Die Gefahr, die zunächst der Mutter droht, ist akute Anämie durch Blutung aus der Rißstelle entweder nach außen oder in die Bauchhöhle, oder die Frau erliegt unter den Erscheinungen des Shoks. Ist die Kranke

über diese Klippen glücklich gelangt, so drohen ihr von Seite des Bauchfelles die Folgen einer traumatischen Peritonäalreizung — jauchige, eiterige Bauchfellentzündung, Pyaemie u. s. w. An die Möglichkeit eines glücklichen Ausganges ist wohl nur zu denken, wenn die Entbindung stattgefunden hat, mag nun das Kind im Cavum uteri verblieben oder in die Bauchhöhle ausgetreten sein, denn die Rettung von einer allmählichen Selbstelimination der abgestorbenen Frucht — nach einer vorausgegangenen Adhäsiv-Entzündung und geschehener Abfackung — durch die Bauchdecken oder das Scheiden- vielleicht auch Darmlumen zu erwarten, zeigt jedenfalls von großer Vertrauensseligkeit.

Die Angaben über das Procentverhältniß der glücklichen Fälle schwanken sehr bedeutend bei den einzelnen Autoren. Die Fälle, die mir vorliegen, endeten sämmtlich mit dem Tode der Mutter und des Kindes. Die günstigste Prognose bieten die Rupturen, welche in altem Narbengewebe, also Stellen früherer Verwundung, Sectio Caesarea oder Narben von früheren spontanen Continuitätstrennungen ihren Sitz haben und hat dies wohl seinen Grund in der geringen Ausdehnung der Wundfläche und der unbedeutenden Blutung.

Wenn wir auf die Therapie zu sprechen kommen, so müssen wir hier unterscheiden zwischen den Mafsnahmen, die eintreten müssen, wenn die Ruptur erfolgt ist und den prophylaktischen Hilfeleistungen bei drohenden spontanen Rupturen der Gebärmutter. Ist die Ruptur eingetreten und die Frucht im Uterus verblieben, so kann bei Kopflagen und nicht zu hochgradiger Beckenverengerung ein Zangen-Verfuch gemacht werden, jedoch besser wird nach Spiegelberg hier sogleich der Cranioclast angewendet. Bei beweglicher Frucht und abgewichenem Kopfe kann mit Vorsicht die Wendung auf die Füße vorgenommen werden, woran sich die Extraction zu schliessen hat, auch wenn schon ein Theil der oberen Körperhälfte durch die Rißstelle ausgetreten ist. Als contraindicirt wird sie heutzutage betrachtet, wenn die untere Körperhälfte in die Bauchhöhle ausgetreten

ist, indem dadurch der Riss offenbar vergrößert und das Bauchfell durch ein Eingehen mit der Hand in das Peritoneal-Cavum neuen Infulten ausgesetzt wird; in diesem Falle und wenn die Frucht ganz ausgetreten ist in den Bauchraum, hat die Entbindung durch Laparotomie und Entleerung der Bauchhöhle auf diesem Wege zu geschehen, ein Verfahren, das bisher schon die günstigsten Procentverhältnisse aufgewiesen hat und in der neueren Zeit immer mehr seine Schrecken verliert; es kommt dabei hauptsächlich auf eine möglichst sorgfältige Reinigung des Bauchfellraumes an — toilette péritonéale.

Haben wir es in der Uterusruptur mit einem so ominösen Ereignisse zu thun, das, wenn einmal gesetzt, so wenig günstige Chancen für Erhaltung des kindlichen wie mütterlichen Lebens bietet, so werden wir uns dadurch aufgefordert fühlen, demselben nach Möglichkeit vorzubeugen und wird sich diese Prophylaxis sehr umfassend gestalten, wenn wir bedenken, daß jedes verengte Becken dazu Veranlassung geben kann; die Therapie bei engem Becken kommt also hier in Betracht und ist bei entsprechenden Graden der Verengerung die künstliche Frühgeburt schon aus dem Grunde zu empfehlen, um einer besonders bei Mehrgebärenden möglicherweise eintretenden Gebärmutter-Zerreißung vorzubeugen. Es wird für uns somit die Aufgabe resultiren, in allen Fällen, wo wir es mit einer langen Geburtsdauer, schmerzhaften, heftigen aber doch erfolglosen Wehen zu thun haben, zunächst eine genaue Untersuchung auf die Beckenbeschaffenheit, die Fruchtlage und die Beschaffenheit des Cervix vorzunehmen. Stossen wir auf ein enges Becken und hat das räumliche Mißverhältniß bereits zu einer bedeutenden Verlängerung und Verdünnung des Halstheiles Veranlassung gegeben, so ist bei abgestorbener Frucht unbedingt und bei lebender, wenn ein Wendungs- und Extraktionsversuch nicht leicht gelingt, die Beendigung der Geburt durch Anwendung des Cranioclasten oder Perforation mit Cephalotripsie angezeigt. In den Fällen, wo es sich aber darum handelt, ein lebendes Kind zu Tage zu

fördern, wie auch bei den hochgradigsten Beckenverengerungen, ist absolut die Sectio Cäsarea zu empfehlen, die, mit den nöthigen Cautelen vorgenommen, gewifs auch für die Mutter eine günstigere Prognose stellen läfst, als eine nach Austritt der Frucht in die Bauchhöhle nöthig gewordene Laparotomie oder Extraktion des Kindes per vias naturales.

Ich lasse hier die Beschreibung von sechs Fällen von Ruptura uteri folgen, welche an hiesiger Klinik und Poliklinik zur Beobachtung kamen und von denen mir die Präparate, theilweise auch die Geburts- und Krankengeschichten nebst den Becken vorliegen.

I. Die 37jährige Drittgebärende E. R., welche die beiden ersten Male angeblich mit der Zange entbunden worden war, kam den 12. I. 1860 Nachm. 3 $\frac{1}{2}$ Uhr kreisend in die Anstalt; es war eine erste Scheitellage; die Wehen waren in der ersten Periode normal, das Fruchtwasser floss um 8 Uhr Abends bei thalergroßem Muttermunde ab und wurden nun die Wehen sehr schmerzhaft, nahmen mehr spastischen Charakter an, doch nahm die Geburt ihren Verlauf, und nach zwei Stunden erschien zweifellos der Kopf in der Schamspalte, wo er indeß, da nun die Wehen nachliessen, fünf Stunden stehen blieb — plötzlich erwachten die Wehen wieder und die Gebärende bekam das Gefühl, als ob etwas in ihrem Leibe geborsten sei, Blut ging wenig ab, aber der Kopf war aus der Schamspalte verschwunden und ergab die ärztliche Untersuchung am 13. Früh 8 Uhr: Allgemeinzustand der Gebärenden ziemlich normal, Puls 96—104, Temperatur normal, spontan und bei Druck auf den Unterleib Schmerzen daselbst, Leib mässig ausgedehnt, Fundus uteri nach rechts abgewichen, nach links unten über dem Schambeine eine harte kugelige Geschwulst, vermuthlich Kopf, leicht abzugrenzen, Herztöne früher deutlich links unten zu hören, nun verschwunden; bei der inneren Untersuchung Beckenhöhle leer, Scheidengewölbe weich, lappig, Ränder an einander liegend, selbst durch Eingehen mit der halben Hand konnte man auf keinen vorliegenden Kindes-

theilkommen. Man fühlte nach rechts ein Stück der Portio vaginalis, darüber eine beträchtliche Continuitätstrennung, die nach vorne durch eine elastische Masse, die Harnblase, nach oben von einem fetzigen, dem Uterus angehörenden Rande begrenzt wurde. Die Erwägung dieser Verhältnisse gab die Diagnose auf Ruptura uteri an die Hand und entschloß man sich, da das Kind todt war, zur Wendung auf die Füße und Extraktion, die nur als es auf die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes ankam, bedeutende Schwierigkeiten darbot, obgleich der Mund nach hinten und links so tief stand, daß man bequem zwei Finger in denselben einführen konnte; und die Entwicklung des Kopfes gelang erst nach Anwendung einer bedeutenden mit den Händen ausgeübten Gewalt. Placenta folgte, Blut ging wenig ab. Das Befinden der Wöchnerin war in der ersten Zeit nach der Geburt und den ganzen 13. Januar hindurch auffallend gut; Abdomen fast schmerzlos, nicht besonders aufgetrieben, die Sekretion aus den Genitalien gering, Haut warm, Respiration normalfrequent, der Gesichtsausdruck ruhig, Puls 104—112, wiederholt war Schlaf eingetreten vielleicht in Folge der Darreichung von größeren Dosen Opium; diese Symptome hätten in der That an der Diagnose irre machen können, wenn das Vorhandensein einer Ruptur nicht objectiv zu sicher festgestellt worden wäre; die Patientin starb am 16. i. 60 Früh 3 $\frac{1}{2}$ Uhr, also 66 Stunden nach geschehener Ruptur.

Die Section ergab mäßiges fibrinös-seröses Exsudat im Abdomen und einen Querriß des Cervix in der ganzen Ausdehnung seiner vorderen Wand. Das Bauchfell war in verhältnißmäßig geringer Ausdehnung eröffnet.

Bei der Obduktion des Kindes fand man sowohl zwischen Cranium und Epicranium als zwischen letzterem und der Kopffchwarte umfängliche Blutextravasate, die Pfeilnaht sowie auch ein Theil der linken Lambdanaht zeigen sich zerrissen, die Dura mater an den entsprechenden Stellen ebenfalls, so daß nach Abtragung der Kopffchwarte dort die Gyri des Gehirns blosliegen; die Oberfläche des Ge-

hirns war stark injicirt, aber frei von Extravasaten, ebenso wie die Gehirns substance.

Die Durchmesser des Schädels betrugen:

der diagonale	13 $\frac{1}{2}$ Ctm.
der gerade	12 „
der quere	9 „
der Kopfumfang	35 „

Das Becken macht beim ersten Anblicke den Eindruck eines allgemein zu kleinen Beckens, was auch durch die Messung bestätigt wird; außerdem bietet es noch mancherlei Eigenthümlichkeiten, die es zu einem allgemein verengten platten oder allgemein ungleichmäÙig verengten rachitischen Becken stempeln.

Es ist dieser Fall von v. Hecker in der Klinik für Geburtskunde von Hecker und Buhl Jahrg. 1861 veröffentlicht und die folgende Beckenbeschreibung derselben entnommen: „Das präparirte und in der Sammlung der Anstalt aufbewahrte Becken muß wohl zu den rachitischen gezählt werden, obwohl auch die mittlere und untere Apertur zu eng sind und deshalb die Bezeichnung „allgemein zu klein“ ebenfugut gelten würde; es zeichnet sich bei einer mittleren Verengerung der Conj. (3“ P.) besonders durch einen sehr tiefen Stand des Kreuzbeines und seines Vorberges, durch eine starke Krümmung des ersteren von oben nach unten und dem entsprechend durch eine starke Hervorragung des letzteren aus. In Folge dieses tiefen Standes und der zusammengedrückten Gestalt des Kreuzbeines ragen die Darmbeinschaufeln nach oben beträchtlich über das Kreuzbein hinaus. An der hinteren Fläche der Symphyse befindet sich eine abnorm starke Prominenz des Knorpels, eine wahre Ecchondrosis, die an dem frischen Becken beträchtlich stärker war als an dem getrockneten und die gewiß mit als ätiologisches Moment für das Zustandekommen der Ruptura uteri betrachtet werden muß. Die an dem Becken befindlichen 8 Wirbel zeigen in ihrem untersten Theile eine leichte Scoliose nach rechts, die in den oberen Partien, namentlich dem 1. und 2. Lendenwirbel in eine

„Ausbeugung nach links übergeht, der wiederum im Leben „eine primäre rechtsseitige Scoliose der Brustwirbel ent- „sprochen haben mag; wenigstens ist ein solches Verhält- „niss in den beiden letzten noch vorhandenen Brustwirbeln „schon angedeutet. Am Kreuzbeine sieht man deutlich eine „Verstellung nach links; ausserdem ist der untere Theil der „Wirbelsäule stark nach vorne vorgeschoben (Lordosis).“

„Es folgen die hauptsächlichlichen Masse des Beckens:

„Beckeneingang	{	Conj. vera 3" $\frac{1}{2}$ "
		Diam. tr. 4" 7"
		Diam. obl. d. 4" 8"
		„ „ f. 4" 5"

„Conj. diagonal. 3" 7"

„Höhe d. Symphyse 1" $\frac{5}{2}$ "

„Von der Spitze des Steissbeines zum Promont. als „gerade Linie 3" 3"

„Dieselbe Entfernung als krumme Linie 4" 11"

„Gerader Durchm. d. Beckenw. 4"

„Querdurchm. d. Beckenenge 3" 4"

„ „ d. Beckenausg. 3" 6"

„Spin. ant. sup. os. il. 7" 9"

„Crift. os. il. 9" 3" „

Ueber die Jugend und die früheren Geburten der R. ist nichts Näheres bekannt. Was nun die Beurtheilung des Falles selbst anbelangt, so ist hier mehreres auffallend: 1) der verhältnissmässig rasche Durchtritt des kindlichen Kopfes durch den ziemlich verengten Beckenkanal; 2) die fünfstündige Wehenpause nach dem Erscheinen des Kopfes in der Schamspalte und das plötzliche Wiedereinsetzen der Wehen mit dem bekannten tragischen Ende; 3) das Zurückweichen des Kopfes aus der Schamspalte durch den verengten Kanal, den er vor fünf Stunden passirt, und die Geburt deselben ins Abdomen.

Es sei mir gestattet, einen Versuch zu machen, diesen Fall zu erklären. Nachdem der nicht grosse Kopf durch die kräftige Wehenthätigkeit bis zum Beckenausgange be-

fördert war, wäre es nun daran gewesen, auch die Schultern dem Kopfe nachzuschicken, was aber an der Erschöpfung des Uterus, vielleicht auch an einer queren Einstellung der Schultern scheiterte und wogegen auch der verengte Beckenausgang sich stemmte, der die Geburt des Kopfes nicht gestattete — es trat eine fünfstündige Pause ein, während welcher der Rumpf am Beckeneingange auffas, oder schon in denselben eingezwängt war; der bedeutende Vorsprung des Symphyfenknorpels that unterdeß an dem nun schon zum dritten Male über Gebühr ausgezogenen und gedehnten Cervix seine Schuldigkeit, welchen er zur Ufur brachte, und wie jetzt der Uterus eine nochmalige Kraftanstrengung machte, um sich seines Inhaltes zu entledigen, gelang ihm dies, jedoch nicht auf dem natürlichen Wege, sondern durch die usurirte Cervixstelle, die den Ausgangspunkt bildete für die durch den Durchtritt des Kindes bedingte Continuitätstrennung. Dafs nun auch der Kopf wieder den Weg zurückmachte, ist schwer erklärlich, aber als Thatfache constatirt.

Auch von Hecker legt in seiner Veröffentlichung des Falles der Hervorragung des Symphyfenknorpels ein ebenso großes Gewicht bei, wie der Beckenverengerung und nimmt an, dafs hier eine ähnliche Wirkung zu Stande gekommen ist, wie man sie bei sogenannten Stachelbecken beobachtet hat. Er sagt: „die vordere Partie des unteren Uterinfegmentes hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach schon in der „letzten Zeit der Schwangerschaft an dieser Crista verletzt „und nun während der Geburt nachgegeben“; läßt es aber auch unentschieden, warum die Ruptur erst eingetreten ist, als der Kopf schon längst am Beckenausgang angekommen war.

An den Sektionsbefund am kindlichen Schädel, welcher ja durch den bedeutenden Kraftaufwand bei dessen Zutageförderung gesetzt worden war, knüpft von Hecker die Erwägung, dafs der Satz: „bei engem Becken mache der „nachkommende Kopf weniger Schwierigkeiten als der vorangehende“, nicht immer richtig sei, und rath daher in

ähnlichen Fällen von einer ausgiebigen Anwendung des manuellen Handgriffes bei der Herausbeförderung des nachkommenden Kopfes Umgang zu nehmen.

Ich möchte fragen, ob in diesem Falle eine künstliche Entbindung mit der Zange, nachdem einmal der Kopf im Beckenausgange stand, nicht ein günstigeres Resultat erzielt hätte, als es die Natur vermochte; es unterblieb auch dieser Eingriff nur, da man wohl die Verengerung, die nicht sehr bedeutend war, kannte, aber auch wufste, dafs die Frau doch schon zwei Geburten durchgemacht hatte, und der Tod des Kindes constatirt war.

II. J. M. 30 J. a. III. G. kam den 18. IX. 61 kreisend in den Gebärsaal, Muttermund vollständig erweitert, Blase gesprungen, mit einer neben dem Kopfe vorliegenden Nabelschnurschlinge, deren Reposition nur mühsam gelang, doch sollen darnach Herztöne hörbar gewesen sein; die Wehen bisher sehr kräftig, liefen um Mitternacht plötzlich nach; die Hebeamme überliefs sich dem Schläfe und die Gebärende ihrem Schicksale, das ebenfalls Schlaf gewesen sein soll. Erst am 19. IX. Morgens fing die M. über Schmerzen im Unterleibe zu klagen und heftig zu erbrechen an. Eine von der Hebeamme vorgenommene Untersuchung ergab keinen vorliegenden Kindestheil mehr. Die Vermuthung eines verhängnissvollen Vorganges lag nahe und bestätigte sich auch durch die Inspektion und äufsere Untersuchung — vollkommene Wehenlosigkeit, ängstlicher Gesichtsausdruck, Singultus, starker Durst, beschleunigte Respiration, normale Temperatur der oberen, verminderte der unteren Extremitäten, bedeutende Empfindlichkeit des Unterleibes, Fluktuationsgefühl, trotz Abflufs des Fruchtwassers, deutlicheres Fühlbarsein der Kindestheile durch die Bauchwandung, Fehlen der Herztöne — bei der inneren Untersuchung trat dem in der Scheide untersuchenden Finger zunächst ein ziemlich grofser herunterhängender Lappen, weiter aufwärts der schlaffe verzogene Muttermund entgegen, am rechten Scheidengewölbe eine querlaufende, trichterförmig sich erweiternde zerklüftete Spalte, durch

welche hindurch man auf den Kopf traf, es lag also wirklich eine Ruptura uteri vor.

Es wurde sofort zur Entbindung der Kreissenden durch Wendung auf die Füße und Extraction geschritten, die bis auf den nachfolgenden Kopf ziemlich leicht gelang, welcher letzterer erst durch wiederholte Manöver zu Tage gefördert werden konnte. Nach Entfernung der Nachgeburt, die einem leisen Zuge an der Nabelschnur folgte, stürzte eine größere Menge flüssigen Blutes nach — während der Operation ging fast kein Blut verloren; das Kind war natürlich todt. Die Wöchnerin starb unter den Erscheinungen der Peritonitis, wobei nur noch erwähnt sein mag, daß während der nächsten sechzig Stunden nach der Entbindung die subjectiven und objectiven Symptome sehr gemäßig waren und Temperatur wie Puls beinahe stets normal blieben.

Das Präparat präsentirt sich wie folgt: Der Vaginaltheil des Cervix ist in einer Länge von 1—1½ Ctm. erhalten; im vorderen Scheidengewölbe besteht median ein 4 Ctm. langer Querriss der Schleimhaut, welche vom Saume der vorderen Muttermundslippe an abgehoben einen wiederum in der Medianlinie der vorderen Lippe 1 Ctm. über dem Lippensaume beginnenden schräg nach links und oben laufenden, etwas gelappten 2 Ctm. langen Riss der Cervixsubstanz erkennen läßt, der sich nun gabelig theilend sowohl nach rechts wie links in Bogenkrümmung nach aufwärts bis zu den seitlichen Anfängen der Substantia uteri fortsetzt, und dadurch einen zungenförmigen oberen Cervixlappen bildet; der Riss von rechts nach links beträgt in feiner Krümmung 16 Ctm., der Peritonealriss ist um 3 Ctm. höher erfolgt als der Riss in Substantia cervicis und ist der zungenförmige Risslappen des Cervix ringsum ungefähr in der genannten Ausdehnung von dem Peritonealüberzuge entblößt. Uteruskörper und Grund sehr mäßig in ihrer Substanz.

Das zugehörige Becken ist durch Rachitis verändert: Promontorium scharf, ragt ziemlich stark in die Beckenhöhle vor — Concav-Krümmung der Kreuzbeinwirbel von links

nach rechts, die Krümmung vom Promontorium zum Steißbein fehlend, Stellung des Kreuzbeines hühnerschwanzartig, Darmbeinschaufeln klein, namentlich das linke Darmbein nach vorne gekehrt, während sich das rechte auszeichnet durch bedeutende Substanzverdünnung in der Fossa iliaca.

Beckenmaße:

Conj. vera.	8,8	Ctm.
Diam. transv.	13,7	„
„ obl. dextr.	13,3	„
„ „ sin.	12,7	„
Conj. diag. des Beckeneinganges . . .	9,9	„
Diam. transv. der Beckenenge	10,38	„
„ „ des Beckenausganges . . .	10,6	„
Höhe der Symphyse	4,1	„
Der Abstand der beiden Spinae ant. sup.		
beträgt	22,96	„
Der Abstand der Crist. ofs. il.	25,51	„

III. Die 27jährige III. G., A. M. G. hatte im September 1861 schon in der Anstalt geboren und zwar ein lebendes Mädchen von $6\frac{1}{2}$ Pfund, das auf dem linken Scheitelbeine eine Grofschen grofse Promontorialmarke trug — die erste Geburtsperiode dauerte damals 2, die zweite 3 Stunden; sie gab auch an, dafs sie ihr erstes Kind, das gröfser gewesen sei als dies zweite, aufserhalb der Anstalt spontan in einer halben Stunde geboren habe, dasselbe lebe noch.

In dem Journal-Bogen über die 2. Geburt ist das Resultat einer Beckenmessung auf 9,48 Ctm. Conj. vera angegeben und dabei bemerkt, dafs das Promontorium dachziegelförmig über den Beckeneingang hereinrage — Spin. ant. sup. 22,25 Ctm. — Crist. ofs. il. 22,25 Ctm. Conj. ext. = 16,92 Ctm.

Den 5. XI. 62 kam die G. wieder in die Anstalt, hatte aber noch sechs Wochen bis zur Entbindung, die sie in derselben verbrachte.

Am 19. XII. Abends 10 Uhr floss ganz ohne vorausge-

gangene Wehen das Fruchtwasser ab. Bei der Untersuchung wurde noch Vaginalportion gefunden, äusserer und innerer Muttermund geöffnet, Herztöne gut, links. Es stellten sich nach und nach Wehen ein, die einen enorm hohen Grad, sowohl was Intensität als Dauer anlangt, erreichten und die beinahe vollständige Erweiterung des Muttermundes zu Stande brachten.

Morgens 7¹/₂ Uhr hörten die Wehen allmählig gänzlich auf — bedenkliche Allgemeinerscheinungen traten ein: verfallenes Aussehen, Puls klein, frequent 132, dabei Erbrechen grünlich gefärbter Flüssigkeiten, Abdomen ungemein schmerzhaft, der leiseste Druck auf dasselbe unerträglich; die vorgenommene Untersuchung liess eine Reduktion des erweiterten Muttermundes erkennen, Kopf sehr hoch vorliegend, starke Kopfgeschwulst; kindliche Herztöne um 10 Uhr nicht mehr hörbar.

Man dachte bei den damals nicht seltenen Fällen von Puerperal-Erkrankung, die in der Anstalt vorkamen, in Erwägung, dass die G. sich schon seit 6 Wochen in der Anstalt aufhielt und da man wusste, dass sie schon zwei Kinder spontan geboren hatte, die Patientin werde an akuter Infektion zu Grunde gehen; es wurde Morphinum subcutan gereicht, Eisblase auf den Leib applicirt, was Erleichterung schaffte; die Wehen mangelten gänzlich, Puls immer elender, steigender Verfall. Auf die Aeusserung der Patientin, dass etwas Blut aus den Genitalien fliesse, wurde nochmals eine Untersuchung vorgenommen und kam man innerhalb des Muttermundes auf einen eigenthümlich sich anführenden Fetzen, den man für einen Placentarlappen hielt, der aber bei genauerer Untersuchung bald eine andere Bedeutung erlangte — kurz, die nunmehrige innere und äussere Untersuchung führte zu der sicheren Diagnose: Ruptura uteri spontanea.

Die Frau wurde entbunden durch Wendung auf die bereits in die Bauchhöhle ausgetretenen Füsse, da der Kopf, der noch im Uterus war, für die Zange zu hoch stand, und

die Patientin schon so zu sagen moribund war. Im Laufe der Operation resp. Narkose verschwand der Puls fast vollkommen, Patientin wurde kühl, Respiration kurz und rasselnd, so dafs man auf den baldigen Tod gefafst war; sie erwachte jedoch wieder aus dem Chloroformschlaf und befand sich relativ gut und erleichtert. Uterus contrahirte sich gut über der Symphyse; diese Euphorie, wozu wohl auch die ziemlich reichlich gereichten Narcotica beitrugen, dauerte bis 21. Morgens und äufserte sich in einem ganz ruhigen mehrstündigen Schlaf. Erst um diese Zeit trat Verschlimmerung aller Symptome ein: Schmerzhaftigkeit des Abdomens, daselbe aufgetrieben, Erbrechen grünlicher später gelb-braunlicher Flüssigkeit von eckelhaft kothigem Geruche, so dafs an eine Einklemmung gedacht werden mußte, Nachmittags 2^{3/4} Uhr Eintritt der Agonie, 3 Uhr Tod.

Sektionsbericht fehlt.

Präparat: Vom äufseren Muttermunde beginnend an der linken Seite des Cervix gerade nach aufwärts gegen die Uterusubstanz steigender completer Rifs von 14 Ctm. Länge, wovon 10 Ctm. auf den verlängerten Cervix und 4 Ctm. auf die seitliche Uterusubstanz treffen; Peritonealhaut in gleicher Höhe und Ausdehnung durchgetrennt. An dem Präparate fällt sogleich eine starke Ausbuchtung des Uterus nach hinten auf, in ihrer oberen Partie von Uterusubstanz, dem grössten Umfange nach aber von dem mäfsig verdünnten Cervix gebildet; durch Muttermund sowohl als durch die Rifsöffnung gelangt man in diese unverkennbare Bucht, die wohl der andrängende Kopf bei den sehr kräftigen Wehen sich gebohrt haben mag. Das Gebärorgan ist im Allgemeinen von mäfsiger Gröfse und mittlerer Dicke der Wandung in Körper und Grund. Eine Einklemmung einer Darmfchlinge in die Uteruswunde war nicht vorhanden.

Das Becken sieht im Ganzen etwas zusammengeschoben aus, erinnert in manchen Theilen an ein männliches; es ist ein allgemein zu kleines Becken.

Beckenmaße:		
Conj. vera	8,5	Ctm.
Diam. transv.	11,7	„
Diam. obl. dextra	11,96	„
„ „ sinistr.	11,28	„
Conj. diag. des Beckeneinganges . .	9,9	„
Diam. transv. der Beckenenge . . .	9,9	„
„ „ des Beckenausganges . . .	9,9	„
Höhe der Symphyse	4,2	„
Abstand der beiden Spinae ant. sup.		
ofs. il.	25,0	„
Abstand der beiden Cristae ofs. il. .	25,0	„
Distantia sacrocotyloidea dextra . .	7,0	„
„ „ sinistra . . .	7,5	„

Die Seitentheile des Kreuzbeines sind sehr wenig entwickelt, Kreuzbein zeigt die hühnerschwanzförmige Krümmung sehr deutlich; über dem wahren Promontorium ragt ein falsches, gebildet von der Verbindung des letzten mit dem vorletzten Lendenwirbel, ziemlich stark in das große Becken herein, überragt das wahre bedeutend, das also jenem gegenüber schon nach rückwärts auszuweichen scheint — nehmen wir den diagonalen Durchmesser des Beckeneinganges zum falschen Promontorium, so erhalten wir 10,7 Ctm. bei Messung zum wahren Promontorium haben wir 9,9 Ctm.; es erhellt aus diesen Maßen das starke Vorspringen des falschen Promontoriums; die Lendenwirbelsäule ragt derart nach vorne, daß eine Maßnahme des Abstandes der Crist. ofs. il. erschwert ist. Die Darmbeinschaukeln sind entsprechend der Fossa iliaca int. durchscheinend; der Arcus pubis ist in einen rechten Winkel verwandelt; in der rechten Pfannengegend erhebt sich ein 2—3 Mllm. hoher spitzer Stachel. Das Becken ist ferner ausgezeichnet durch eine Spina bifida sacralis, der Processus spinosus des letzten Lendenwirbels ist bloß in einem Rudimente angedeutet; in der Höhe des zweiten Kreuzbeinwirbels ist die Rinne durch einen Schaltknochen in einer Länge von 2 Ctm. zu einem Canale geschlossen.

Das Becken trägt also auſſer dem Charakter des allgemein zu kleinen, auch Merkmale des rachitiſch veränderten Beckens an ſich und ſind in dieſem räumlichen Miſsverhältniſſe wieder die urſächlichen Momente für die Ruptur zu ſuchen.

IV. Die 35jährige IV. Geb. A. R. hatte die drei erſten Male in der hieſigen Anſtalt geboren; bei der erſten Geburt, die am 24. III. 69 ſtattſand, wurden bereits die Becken-Verhältniſſe der R. erkannt, zu welcher Erkenntniſſ ſchon der äußere Habitus derſelben Anhaltspunkte bot; auch ergab ſich aus der Anamnese, daſſ ſie erſt mit ſieben Jahren gehen gelernt hatte. Sie kam damals den 22. III. 69 in die Anſtalt, kreißend mit ſehr ſchmerzhaften Krampfwegen; die erſte Geburtsperiode dauerte 40 Stunden, die zweite 30 Minuten; die Geburt erfolgte in erſter Scheitellage, Kind aſphyktiſch, wieder belebt, beträchtliche Kopfgeſchwulſt auf dem rechten Scheitelbeine, linkes Scheitelbein ſtark unter das rechte verſchoben, Promontorialmarke.

Die zweite Geburt fand ſtatt in erſter Scheitellage den 15. IV. 71 nach 13ſtündiger Geburtsdauer, die dritte Geburt den 22. IX. 72 ebenfalls in erſter Scheitellage nach ſechsſtündiger Geburtsdauer; beide Male wurden lebende ausgetragene Kinder geboren.

Den 27. V. 74 Vormittags 10 Uhr kam nun die R. wieder kreißend in die Anſtalt, die Wehen gut und kräftig; das Waſſer floß Nachmittags 3 Uhr bei nahezu erweitertem Muttermunde ab; Nachmittags 5 Uhr wird die R. ſehr aufgereggt und fleht, man möge ſie entbinden; die Unterſuchung ergibt einen Hängebauch von ziemlicher Gröſſe, Oberſchenkel rachitiſch verkrümmt, Uterus feſt contrahirt, bei der inneren Unterſuchung Schädel im Beckeneingange vorliegend, groſſe Fontanelle rechts vorne, erſte Vorderſcheitellage.

Während man erwog, was zu thun ſei, und Herr Obermedicinalrath Dr. von Hecker eine Auskultation der kindlichen Herztöne vornahm, trat plötzlich eine Aenderung der Situation ein: oberhalb der Symphyſe wurde eine kugelige

Geschwulst — contrahirter feines Inhaltes lediger Uterus — gefühlt, darüber in dem sehr ausgedehnten Unterleibe kleine Kindestheile, ein gröfserer Kindestheil rechts, offenbar Kopf, welcher nach rechts und oben ausgewichen war; also war eine Ruptura uteri spontanea mit Austritt des Kindes in die Bauchhöhle eingetreten. Das Auffällige bei dem ganzen Vorgange war, dafs die Person keine Schmerzensäufserung gemacht, in ihrem Pulse keine Veränderung zeigte — 88 Schläge in der Minute, auch das Aussehen componirt blieb. Die Wehen hörten natürlich plötzlich auf. Bei der inneren Untersuchung fand man von dem vorhin deutlich vorgelegenen Kopfe nichts mehr, statt dessen eine schwammige Masse — Placenta. Man entschlofs sich für Entbindung per vias naturales; zu dem Zwecke wurde die Patientin in der rechten Seitenlage narkotifirt. Man ging mit der linken Hand ein und traf im Uterus wieder zunächst auf die Nachgeburt, holte die Füfe herunter, an welchen die Wendung und Extraction vorgenommen wurde, die auch abgehen von ziemlichen Schwierigkeiten bei Lösung der Arme bis auf den nachfolgenden Kopf gelang, der auch einem manuellen Extractionsversuche auf dem hohen Querbette Trotz bot, durch Perforation und Cephalotriphie wurde schliefslich auch dieser zu Tage gefördert; die Placenta folgte. Unter Darreichung von Analepticis und Narcoticis war das Befinden der Patientin bei mäfsiger Temperaturerhöhung und Pulsfrequenz ein relativ gutes. Am 30. Abends bedeutende Temperaturerhöhung, mehr Schmerzen im Unterleibe, Sensorium frei, Tod erfolgte den 31. Nachm. 3 $\frac{1}{2}$ Uhr, also 94 Stunden nach geschehener Ruptur.

Section: In der Bauchhöhle blutig seröses Transsudat, Netz verwachsen mit Uterusgrund, Darmschlingen verklebt, Rifs longitudinal, mehr nach links.

An dem Präparate zeigt sich hinten links ein von innen und unten nach aufsen und oben schräg verlaufender, 13 Ctm. langer, mit zackigen gefetzten Rändern versehener completer Rifs, von dem 2 $\frac{1}{2}$ Ctm. der hinteren Scheiden-

wand, $1\frac{1}{2}$ Ctm. der fettlichen hinteren Uterusubstanz angehören und die übrigen 9 Ctm. auf den somit ziemlich langen Cervix treffen, der also in seiner ganzen Länge zerissen ist; das Peritoneum ist in gleicher Höhe und Ausdehnung mit dem Parenchymrisse durchbrochen; die größte Dicke der Wandung des Uteruskörpers beträgt $3\frac{1}{2}$ Ctm.

Das Becken trägt die Charaktere der Rachitis und ist dabei etwas schräg verengt.

Beckenmaafse:

Conj. vera	8,6 Ctm.
Diam. transv.	14,4 „
„ obl. dextra	13,2 „
„ „ finiftr.	12,2 „
Conj. diag. des Beckeneinganges . .	10,8 „
Conj. externa	15,5 „
Gerader Durchmesser des Beckenaus-	
ganges	9,2 „
Querdurchmesser des Beckenausganges	13,0 „
Höhe der Symphyse	4,3 „
Distantia sacrocotyloidea dextra . .	7,0 „
„ „ finiftra . .	8,5 „

Die Beckenknochen zeigen sämtlich eine deutlich ausgesprochene Düntheit ihres Baues; der aufsteigende Schambeinast zeigt beiderseits, da wo sie sich zur Bildung der Symphyse vereinigen, eine auffallende Einschnürung und Verdünnung und sind in einem ziemlich starken Winkel abgelenkt, nach außen und aufwärts die vorderen Flächen kehrend, demzufolge ist auch der Abstand der Sitzbeinhöcker vergrößert — 13,0 Ctm.

Das Tuberculum pubicum ist an beiden horizontalen Schambeinästen, namentlich aber rechts zu einem knorrigen Knochenvorsprunge mit einer vorderen resp. äußeren und hinteren resp. inneren ziemlich scharfen Spitze versehen — auch das Tuberculum ileopectineum dextr. ist sehr ausgesprochen; die Oberschenkelknochen zeigen auch eine rechterseits wiederum mehr ausgebildete Verkrümmung nach

vorne. Die Gegend über der rechten Pfanne ist mehr in das Becken hereingedrängt als links, und kommt, um die beim ersten Blicke auffallende Raumverringerung der rechten Beckenhälfte gegenüber der linken zu erzeugen, auch das Promontorium dieser Annäherung von Seite der Pfannengegend entgegen, indem eine unverkennbare, wenn auch nicht bedeutende Drehung des Promontoriums nach rechts statt hat und wird daran eine an der Lebenden allerdings nicht constatirte, also jedenfalls geringgradige Wirbelsäule-Verkrümmung die Schuld tragen. Die Kreuzbeinkrümmung von oben nach unten ist auch in mäßigem Grade verstärkt, die Beckenneigung mäßig.

V. Einen Fall von spontaner Ruptur führe ich an, der an der Lebenden gar nicht diagnostiziert wurde:

Die 12. Geb. B. St. 36 J. a. ward am 27. Juni 1874 kreisend in die Anstalt gebracht, sie hatte viel Blut verloren; Muttermund bei der Aufnahme für einen Finger durchgängig, Kopf vorliegend, Wehen nicht besonders kräftig, Fruchtwasser abgeflossen — Analeptica, Weine wurden gereicht; Tomponade der Scheide durch den Colpeurynter ohne Erfolg — man gedenkt der Blutung ein Ende zu machen durch Beendigung der Geburt; der nicht dehnbare Muttermund wird durch Incisionen soweit dilatirt, daß man mit drei Fingern eindringen und nach Empor-drängen des Kopfes einen Fuß erreichen kann; Wendung auf denselben, Blutung steht; unter Mitpressen der Mutter, die aus der Narkose erwacht, erfolgt die Geburt des Steißes, daran reiht sich die Extraktion, die nicht schwer ist — Kopf fährt gleich einer Kugel aus den Genitalien, ihm nach Placenta, Blutcoagula und eine Masse ganz frischen Blutes; Kind todt, Placenta unverfehrt, Blutung dauert fort — Injection von Aether subcutan und Wasser in den Uterus, der sowohl darauf als auch auf andere Manipulationen ihn zur Contraction zu bringen, negativ antwortet; Patientin wird immer blutleerer, Athembewegung und Herzschlag schwächer, seltener. Eine geplante Transfusion verzögert sich — Tod.

Section: Kräftiger Körper, Muskeln stark entwickelt, blafs, Brustorgane gesund. Infertion der Placenta im Fundus uteri, also keine Placenta praevia, wie man hätte denken können, Cervicalcanal noch ziemlich lang, fogar etwas Scheidenportion vorhanden; Uterus zeigt etwas nach links hinten einen Rifs von ungefähr 12 Ctm. Länge, der sich 2 Ctm. weit in die Scheide fortsetzt — das Peritoneum ist nur in einer Ausdehnung von 2 Ctm. durchbohrt und zwar am oberen Ende der Ruptur, während die untere Partie des Risses von dem abgehobenen Bauchfelle äußerlich bedeckt ist.

Den Hergang mag man sich folgendermaßen denken: Vorzeitige Lösung der Placenta, Blutung bei mäfsiger Wehenthätigkeit, Accouchement forcé, da auf anderem Wege der Blutung nicht Halt geboten werden konnte, Ruptura uteri bei Durchtritt der Schultern und des Kopfes, zuerst incompleta — Blutaustritt unter Bauchfellüberzug, Berstung des Sackes — Ruptura completa — Tod durch akute Anämie. Das Becken ist nicht vorhanden und würde daselbe auch kaum Anhaltspunkte für eine spontane Ruptur ergeben, dagegen mag vielleicht ein irregulärer Durchtritt der Schultern und des Kopfes durch den in Folge der vielen früheren und des neuerlichen Geburtsaktes über Gebühr verdünnten und ausgedehnten Cervix das ätiologische Moment für Entstehung der Cervixruptur abgegeben haben, die sich nach oben und unten in eine Continuitätstrennung des Uterus und der Scheide fortsetzte. Eine traumatische Einwirkung anzunehmen, dazu ist durchaus kein Anhaltspunkt vorhanden; doch ist es gewifs einer von den Fällen, der für einen alleinftehenden Geburtshelfer hätte verhängnisvoll werden können.

VI. Es liegt mir nun noch ein Präparat vor, wobei nur zu bedauern ist, dafs über den Geburtshergang keinerlei Aufzeichnungen existiren, auch das Becken mangelt.

Der Fall kam poliklinisch vor und konnte ich nur erfahren, dafs ein Praktikant zu einer Frau gerufen wurde, die er moribund antraf, weshalb er sich nichts mehr zu

unternehmen getraute, die Frau starb und das Präparat kam in die hiesige Sammlung. Es ist ein ausgezeichnete Fall von Ruptura fundi uteri centralis. Bekanntlich wird ein solches Vorkommnis von vielen Autoren, wo nicht in das Bereich des Unmöglichen, so doch sehr Unwahrscheinlichen gestellt, vorausgesetzt nämlich, daß das Uterusgewebe normal ist. So sagt Scanzoni in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe 1855, Seite 446: „Die spontanen Zerreißen des Uteruskörpers und Grundes kommen in der Regel nur dann zur Beobachtung, wenn durch pathologische Veränderungen die Widerstandsfähigkeit seiner Wände vermindert wird, wie dies bei den verschiedenen angeborenen Mißbildungen des Organes, bei einer regelwidrigen Verdünnung oder fettigen Entartung seiner Wandungen, bei verschiedenen in dessen Parenchym gebetteten Pseudoplasmen, bei Narben nach überstandenen Kaiserschnitten der Fall ist“; und weiter: „Gewiß nur in den seltensten Fällen erleidet der vollkommen gesunde Uteruskörper oder Grund eine Ruptur, wofür schon die Erfahrung spricht, daß zuweilen Frauen, bei welchen sich dem Austritte des Kindes ein bedeutendes, nicht zu befeitigendes Hindernis, entgegenstellt, nach tagelanger Geburtsdauer unentbunden starben, ohne daß eine Zerreißen der Gebärmutter erfolgt wäre“. Diese letztere Induktion beweist jedoch nur, daß der Uterus, wenn gesund, manchmal nicht im Stande ist zu zerreißen und eher erkrankt und erlahmt; sie beweist jedoch nicht, daß ein gesunder Uterus überhaupt nicht zerreißen könne.

In der IV. Auflage seines Lehrbuches der Geburtshilfe 1867 gibt Scanzoni die Möglichkeit einer Ruptur des Uteruskörpers und Grundes gleichfalls zu, führt als begünstigende Momente Beckenverengerung und regelwidrige Kindeslagen, insbesondere Querlagen bei Mehrgebärenden an, erblickt jedoch immer das wesentliche Moment in einer Prädisposition des Uterusparenchyms.

Auch Franqué, der allerdings den Sitz der Ruptur im Grunde und Körper als etwas häufiges bezeichnet, hält, wo

er von der Aetiologie der Uterusruptur während der Geburt spricht, eine spontane Zerreiſung des Uterus ohne eine im Parenchyme deſſelben ſelbſt liegende Prädiſpoſition für kaum möglich und ſucht die letztere meiftens in abnormer Dünnhcit, Verdünnung oder Erweichung des Uterus-Parenchyms.

Und Bandl ſagt: „Ich muß das Ausgehen des Riſſes „vom Körper oder Grunde des Uterus als ein überaus ſeltenes Ereigniß (wenn es überhaupt vorkommt) betrachten“. Analyſiren wir nun den Fall, ſoweit dies möglich iſt an der Hand des Präparates, das noch in derſelben Weiſe erhalten iſt, wie es acquirirt wurde: die Scheidenwand iſt glatt, von der Scheidenportion iſt noch ein $\frac{1}{2}$ Ctm. langer Saum erhalten, ganz glatt, ohne Einkerbungen oder Narben, welcher Befund dafür ſpricht, daß wir es mit einer Erſtgebärenden zu thun haben. Der Cervix, ein häutiger Schlauch, der an manchen Stellen ganz durchſcheinend iſt, hat eine Länge von 11 Ctm. und iſt der Kopf theilweiſe in ihn eingetreten; die Scheide iſt an der rechten Seite geöffnet und auch die Cervixwand bis zur halben Höhe eingefchnitten. Der Sagittaldurchmeſſer des kindlichen Kopfes fällt zuſammen mit der Medianlinie der Cervixhöhle von vorne nach hinten, es ſcheint alſo der Kopf im geraden Durchmeſſer der Beckenhöhle, in Anbetracht der Länge des Cervix vielleicht erſt im geraden Durchmeſſer des Beckeneinganges geſtanden zu ſein; an der Cervix-Innen- und Außenwand iſt nichts Abnormes zu conſtatiren und fällt an dieſem Abſchnitte des Gebärorganes bloß die bedeutende Verdünnung auf. Der Uteruskörper ſitzt dem Cervix wie ein verkehrter Pilz, alſo mit der Schale nach oben auf und wird er durch den theilweiſe in ihm eingefchloſſenen und von dem rupturirten Uterusgrunde umſpannten kindlichen Kopfe in dieſer Configuration erhalten. Die Decke der Uteruswandung ſchwankt zwiſchen 2—3 Ctm. und ſind wenigſtens jetzt, nachdem das Präparat allerdings zehn Jahre dem Einfluſſe des Weingeiſtes ausgeſetzt war, die Dimenſionen des Gebärorganes ſo gering, daß man

fragen möchte, wie es möglich war, dafs in diefsem kleinen Raume ein ausgetragenes, fogar grofses und kräftiges Kind, nebst Adnaxis und Fruchtwaffer Platz finden konnte — Kind (Mädchen) 50 Ctm. lang, Nabelfchnur — an der Placentarinfection abgetrennt — 67 Ctm., Placenta fehlt. Soweit möglich wurden auch die Mafse am kindlichen Schädel genommen:

Vom Kinn bis zur kleinen Fontanelle 11,5 Ctm.

Der grofse quere Durchmesser . . . 9,4 „

Der grofse fchräge Durchmesser . . 13,0 „

Kopfgeschwulft noch fehr deutlich am linken Scheitelbeine und linken oberen Hälfte des Hinterhauptbeines, doch breitet fie fich auch über die Sagittalnaht etwas nach rechts aus. Die Ränder des Risses, der die ganze Breite des Fundus durchmifst, also quer von rechts nach links geht, lafsen da, wo eine Differenzirung von der Uterus-Innenfläche möglich ift, eine Dicke von 1 bis 1½ Ctm. auferdem aber keine partielle Verdünnung oder Einlagerung von Pseudoplasmen, Narben u. f. w. erkennen. Der kindliche Kopf ift bis zum Munde in die Bauchhöhle geboren und wird wie erwähnt, in feiner oberen Hälfte von Uterusubftanz umhüllt; verfolgt man prüfend zwifchen zwei Fingern die Dicke der Wandung vom Cervix gegen den Fundus, fo ift die Verjüngung des Dickendurchmessers unverkennbar; das Peritoneum ift in gleicher Ausdehnung mit dem Uterusparenchym durchbrochen.

Ueber die Aetiologie diefer Ruptur wiffen wir nun leider nichts Gewiffes, doch weist die Verlängerung und Verdünnung des Cervix, auch die jetzt noch deutlich erkennbare Kopfgeschwulft auf einftattgehabtes mechanifches Geburtshindernifs hin; auch fcheint die Stellung der Frucht eine fehlerhafte gewesen zu fein, indem der Sagittaldurchmesser des kindlichen Schädels im geraden Durchmesser des Beckeneinganges geftanden fein mufs, nach der jetzt noch bestehendenEinstellung des Kopfes in den Cervicalschlauch, doch wollen wir auf letzteres nicht zu viel Werth legen.

Was nun die Veranlassung bot, daß der Uterus im Fundus zerrissen ist, ist schwer zu beurtheilen:

Wir haben es zu thun mit einer spontanen Ruptur des Grundes bei ganz normalem Gewebe, zu einer Zeit, da die Eröffnungsperiode ihr Ende erreicht hat, wie die Cervix-Verhältnisse zeigen, auch handelt es sich vermuthlich um eine Erstgeburt — ebenfalls aus der Beschaffenheit des unteren Cervixabschnittes ersichtlich, und der Uteruskörper scheint in seinen Dimensionen verkleinert, verkürzt. Bei dem Geburtshergange findet nun normal durch die Wehenthätigkeit eine Streckung des Fruchtkörpers statt und bilden oberes und unteres Fruchtende die beiden Pole der Fruchtaxe, auf welche in radiärer Richtung die Expulsivkräfte des Gebärgorganes wirkend gedacht werden müssen; durch dieselben wird nun die Axe in leicht drehender Bewegung nach der Seite des geringeren Widerstandes, bei normaler Geburt also des Poles A vorgefchoben, während der Pol B den Hauptangriffspunkt für die austreibenden Kräfte bildet, folglich auch den größten Gegendruck gegen die Uteruswand ausübt, der bei einer gewissen Höhe doch zu einem gewissen Grade von Dehnung und Ausbuchtung des Gewebes führen muß. Stehen nun dem Pole A, der gegen die natürliche Oeffnung des Uterusraumes gerichtet ist, einerseits in dem verengten Becken andererseits in der Elasticität und Unzerreißlichkeit des Halstheiles zu große Hindernisse entgegen, sowohl sich den natürlichen Weg für seinen Durchtritt, als einen neuen zu bahnen, so ist nicht recht einzusehen, warum man die Möglichkeit, daß sich Pol B eine Passage nach seiner Richtung eröffnen könne, abstreiten sollte — für den Fall, daß die austreibenden Kräfte nachhaltig genug sind. Es muß also in einem solchen Falle angenommen werden, daß sich Pol B id est oberes Fruchtende durch allmähliche Verdünnung und schließliche Continuitätstrennung des Uterusgrundes Luft machen kann, überhaupt, daß eine spontane Ruptur des Uterusgrundes bei normalem Gewebe möglich ist; eine Verkürz-

ung des Uterus in der Längsaxe wird das Zustandekommen dieses Ereignisses begünstigen. Dafs aber hier der Cervix so nachdrücklich Widerstand leistete, ist in dem Umstande zu suchen, dafs er noch nie eine Dehnung und Zerrung durch frühere Geburten erfahren hatte.

ad 5) Wir haben bei der Eintheilung der Rupturen nach Urfachen der violenten Ruptur erwähnt und kommt dieselbe in gerichtlich-medicinischer Beziehung in Betracht. Es ist allerdings ein etwas deprimirendes Bewuststsein für den Arzt, nachdem er nach bestem Wissen Mühe und Zeit aufgewendet, sich schliesslich noch vor den Schranken des Gerichtes verantworten zu müssen und dadurch gar häufig seinen Ruf untergraben, seine Stellung gefährdet zu sehen, und ist es gar nicht zu wundern, wenn man selbst von sonst ganz gewissenhaften Aerzten die Aeußerung hören kann, „sie würden sich hüten, in solch' verzweifelten Fällen Hilfeleistung zu versuchen in der Erwägung, sich die Gefährlichkeit eines unglücklichen Ausganges und die Folgen einer möglichen peinlichen Untersuchung zu ersparen“; indess läßt sich gegen das Gesetz nicht rechten und ist der beste Schutz gegen solche unangenehme Erfahrungen jedenfalls nur in der genauen Erkenntnis, die man erlangt durch eine gewissenhafte Untersuchung und in der richtigen Würdigung der gegebenen Verhältnisse gelegen. Auf der anderen Seite ist es nicht zu leugnen, dafs unvorsichtige, kunstwidrige Hilfeleistung das Ereignis einer Ruptur herbeiführen kann, welches vielleicht bei Wahrung kunstfertigerer Hand vermieden worden wäre; so kann durch Eindringen der Hand in den Uterus zum Zwecke der Wendung auf die Füße eine Ruptur erfolgen durch plötzliche Vermehrung des Inhaltes; häufiger sind noch, veranlaßt durch gewaltsame Applikation der Zange und Entbindungsversuche, Verletzungen des Cervix, von welchen aus sich die Continuitätstrennung fortsetzen kann. Wie schwer es aber oft ist zu entscheiden, ob die Schuld am Arzte oder an der Constellation der natürlichen Verhältnisse liegt, möge ein

Fall beweisen, den von Hecker *) veröffentlicht und den ich zum Ende fragmentarisch anzuführen mir erlaube:

Ein Arzt wurde Abends zu einer Drittgebärenden gerufen, die das erste Mal nach mißlungenem Zangenversuche durch Wendung von einem todten Kinde entbunden worden war und das zweite Mal eine spontane Frühgeburt durchgemacht hatte. Der Arzt traf die Frau wehenlos seit 8 Stunden, Fruchtwasser seit 12 Stunden abgeflossen, Unterleib empfindlich, Gesichtszüge verfallen, Puls schwach frequent, Patientin voll Angst und Unruhe; bei der inneren Untersuchung Muttermund über den Kopf zurückgezogen, der letztere in erster Position hoch im Beckeneingange stehend, Beckenräumlichkeit nicht ungünstig, Uterus fühlt sich schlaff an. Es wurde aus diesen Symptomen die Indication für Beschleunigung der Geburt genommen und ein Zangenversuch gemacht, bei der Einführung der Zangenlöffel Abgang von coagulirtem und flüssigem Blute, Schluss kam nicht zu Stande, und man entschloß sich zur Wendung und Extraktion an den Füßen.

Beim Eingehen mit der Hand hatte der Arzt das Gefühl, als ob er mit den Fingerspitzen über einen Lappen streife — Wendung und Extraktion bis auf Lösung der Arme leicht, bei letzterer vermehrter Kraftaufwand, Kopf folgte nicht den gewöhnlichen Handgriffen, auch die Anwendung der Zange, die zwar zum Schlusse gebracht wurde, mit der man aber wegen des hohen Kopfstandes keine ergebigen Traktionen machen konnte, führte nicht zum Ziele — Abtrennung des Kopfes mit dem Federmesser in der Hoffnung, demselben eine bessere Stellung geben zu können — auch die weiteren (Zangen)-Versuche den Kopf zu entwickeln, mißlingen, Einführung der Hand und Zug am Unterkiefer endet damit, daß die Hand mit dem abgebrochenen Unterkiefer aus der Scheide herauschnellt, Aufgeben der weiteren Entbindungsversuche in der Ueberzeug-

*) Friedreich's Blätter über gerichtliche Medicin, 20. Jahrgang. 1869, Pag. 1.

ung des baldigen Todes; der Arzt verläßt die Kranke um 11 Uhr — Tod Morgens 3 Uhr.

Es wurde Klage gegen den Arzt gestellt, und folgender Sektionsbefund an der exhumirten Leiche erhoben: Uterus nach rechts gelagert, Kindskopf mit Nachgeburt, Eihäuten und Nabelschnur in die Bauchhöhle ausgetreten; Scheidengewölbe, Gebärmutterhals und unteres Uterinsegment in der Länge von 6 Zoll und in der Breite von 3 Zoll eingerissen; Schambeinverbindung in der Höhe eines Zolles getrennt.

Das bezirksgerichtliche Gutachten hatte gelautet, daß die Frau in Folge eines Gebärmutterrisses gestorben, daß sich aber weder mit Gewißheit, noch mit Wahrscheinlichkeit behaupten lasse, ob dieser spontan oder gewaltsam entstanden sei.

Gutachten des königlichen Medicinal-Collegiums: I) Als Ursache des Todes muß die Gebärmutter-Zerreißung angesehen werden; II) es läßt sich weder mit Gewißheit noch mit irgend einem Grade von Wahrscheinlichkeit behaupten, daß der Tod durch die Eingriffe des Arztes beim Geburts-Akte oder durch Unterlassung der Anwendung weiterer Hilfen nach erfolgter Abtrennung des Kindskopfes und nach dem mißlungenen Versuche, denselben zu extrahiren verursacht worden ist, dagegen aus der Betrachtung des aus der Leiche ausge schnittenen Beckens und der Erwägung der anamnestischen Momente constatiren, daß es sich um eine spontane Gebärmutter-Zerreißung handelt.

Das Becken ist allgemein verengt.

Beckenmaße:

Spinae ant. sup. 18,2 Ctm.

Crist. ofs. il. 25,0 „

Beckeneingang:

Conj. vera 8,9 „

Querdurchmesser 12,1 „

I. schräger Durchmesser . . 12,1 „

II. „ „ . . 11,7 „

Conj. diag. 9,7 „

Beckenweite:

Gerader Durchmesser . . .	10,6 Ctm.
Querdurchmesser . . .	11,2 „
I. schräger Durchmesser . .	11,7 „
II. „ „ . .	11,6 „

Beckenenge:

Gerader Durchmesser . . .	11,7 „
Querdurchmesser . . .	9,9 „

Beckenausgang:

Gerader Durchmesser . . .	10,8 „
Querdurchmesser . . .	10,1 „
Höhe der Schamfuge . . .	3,6 „

Der kindliche Kopf bietet zwar keine besonders großen Dimensionen dar, hat aber kräftige Knochen und kann auch jetzt noch nicht anders als mit dem Gesichte voran durch den Beckenkanal hindurchgeführt werden.

Das plötzliche Aufhören der Wehentätigkeit, der Abgang des geronnenen und flüssigen Blutes bei Einführung der Zangenlöffel, das leichte Gelingen der Wendung, das subjective Gefühl des operirenden Arztes beim Einführen der Hand, als streife er über einen Lappen, sprechen dafür, daß die Ruptur schon zur Thatfache geworden war, als er seine Entbindungsversuche begann.

Auf diese Constatirungen stützte sich die Rechtfertigung der Handlungsweise des betreffenden Arztes durch das königliche Medicinalcomité, indem es in der Abtrennung des Kopfes wohl eine wissenschaftlich zu verwerfende Maßnahme aber nicht ein Object für eine gerichtliche Maßregelung gegeben erklärte, das vorausgehende und nachfolgende Verfahren des Arztes aber als vollkommen korrekt bezeichnete. Die Untersuchung wurde auf dies wissenschaftliche Gutachten hin eingestellt.

V. Mayring.



Section: Kräftiger Körper, Muskeln stark entwickelt, blaß, Brustorgane gesund. Infertion der Placenta im Fundus uteri, also keine Placenta praevia, wie man hätte denken können, Cervicalcanal noch ziemlich lang, fogar etwas Scheidenportion vorhanden; Uterus zeigt etwas nach links hinten einen Riß von ungefähr 12 Ctm. Länge, der sich 2 Ctm. weit in die Scheide fortsetzt — das Peritoneum ist nur in einer Ausdehnung von 2 Ctm. durchbohrt und zwar am oberen Ende der Ruptur, während die untere Partie des Risses von dem abgehobenen Bauchfelle äußerlich bedeckt ist.

Den Hergang mag man sich folgendermaßen denken: Vorzeitige Lösung der Placenta, Blutung bei mäßiger Wehenthätigkeit, Accouchement forcé, da auf anderem Wege der Blutung nicht Halt geboten werden konnte, Ruptura uteri bei Durchtritt der Schultern und des Kopfes, zuerst incompleta — Blutaustritt unter Bauchfellüberzug, Berstung des Sackes — Ruptura completa — Tod durch akute Anämie. Das Becken ist nicht vorhanden und würde daselbe auch kaum Anhaltspunkte für eine spontane Ruptur ergeben, dagegen mag vielleicht ein irregulärer Durchtritt der Schultern und des Kopfes durch den in Folge der vielen früheren und des neuerlichen Geburtsaktes über Gebähr verdünnten und ausgedehnten Cervix das ätiologische Moment für Entstehung der Cervixruptur abgegeben haben, die sich nach oben und unten in eine Continuitätstrennung des Uterus und der Scheide fortsetzte. Eine traumatische Einwirkung anzunehmen, dazu ist durchaus kein Anhaltspunkt vorhanden; doch ist es gewiß einer von den Fällen, der für einen alleinstehenden Geburtshelfer hätte verhängnisvoll werden können.

VI. Es liegt mir nun noch ein Präparat vor, wobei nur zu bedauern ist, daß über den Geburtshergang keinerlei Aufzeichnungen existiren, auch das Becken mangelt.

Der Fall kam poliklinisch vor und konnte ich nur erfahren, daß ein Praktikant zu einer Frau gerufen wurde, die er moribund antraf, weshalb er sich nichts mehr zu

unternehmen getraute, die Frau starb und das Präparat kam in die hiesige Sammlung. Es ist ein ausgezeichnete Fall von Ruptura fundi uteri centralis. Bekanntlich wird ein solches Vorkommnis von vielen Autoren, wo nicht in das Bereich des Unmöglichen, so doch sehr Unwahrscheinlichen gestellt, vorausgesetzt nämlich, daß das Uterusgewebe normal ist. So sagt Scanzoni in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe 1855, Seite 446: „Die spontanen Zerreißen des Uteruskörpers und Grundes kommen in der Regel nur dann zur Beobachtung, wenn durch pathologische Veränderungen die Widerstandsfähigkeit seiner Wände vermindert wird, wie dies bei den verschiedenen angeborenen Mißbildungen des Organes, bei einer regelwidrigen Verdünnung oder fettigen Entartung seiner Wandungen, bei verschiedenen in dessen Parenchym gebetteten Pseudoplasmen, bei Narben nach überstandenen Kaiserschnitten der Fall ist“; und weiter: „Gewiß nur in den seltensten Fällen erleidet der vollkommen gesunde Uteruskörper oder Grund eine Ruptur, wofür schon die Erfahrung spricht, daß zuweilen Frauen, bei welchen sich dem Austritte des Kindes ein bedeutendes, nicht zu beseitigendes Hindernis, entgegenstellt, nach tagelanger Geburtsdauer unentbunden starben, ohne daß eine Zerreißen der Gebärmutter erfolgt wäre“. Diese letztere Induktion beweist jedoch nur, daß der Uterus, wenn gesund, manchmal nicht im Stande ist zu zerreißen und eher erkrankt und erlahmt; sie beweist jedoch nicht, daß ein gesunder Uterus überhaupt nicht zerreißen könne.

In der IV. Auflage seines Lehrbuches der Geburtshilfe 1867 gibt Scanzoni die Möglichkeit einer Ruptur des Uteruskörpers und Grundes gleichfalls zu, führt als begünstigende Momente Beckenverengerung und regelwidrige Kindeslagen, insbesondere Querlagen bei Mehrgebärenden an, erblickt jedoch immer das wesentliche Moment in einer Prädisposition des Uterusparenchyms.

Auch Franqué, der allerdings den Sitz der Ruptur im Grunde und Körper als etwas häufiges bezeichnet, hält, wo

er von der Aetiologie der Uterusruptur während der Geburt spricht, eine spontane Zerreiſung des Uterus ohne eine im Parenchyme deſſelben ſelbſt liegende Prädiſpoſition für kaum möglich und ſucht die letztere meiftens in abnormer Dünnhcit, Verdünnung oder Erweichung des Uterus-Parenchyms.

Und Bandl ſagt: „Ich muß das Ausgehen des Riſſes „vom Körper oder Grunde des Uterus als ein überaus ſeltenes Ereigniß (wenn es überhaupt vorkommt) betrachten“. Analyſiren wir nun den Fall, ſoweit dies möglich iſt an der Hand des Präparates, das noch in derſelben Weiſe erhalten iſt, wie es acquirirt wurde: die Scheidenwand iſt glatt, von der Scheidenportion iſt noch ein $1\frac{1}{2}$ Ctm. langer Saum erhalten, ganz glatt, ohne Einkerbungen oder Narben, welcher Befund dafür ſpricht, daß wir es mit einer Erſtgebärenden zu thun haben. Der Cervix, ein häutiger Schlauch, der an manchen Stellen ganz durchſcheinend iſt, hat eine Länge von 11 Ctm. und iſt der Kopf theilweiſe in ihn eingetreten; die Scheide iſt an der rechten Seite geöffnet und auch die Cervixwand bis zur halben Höhe eingefchnitten. Der Sagittaldurchmeſſer des kindlichen Kopfes fällt zuſammen mit der Medianlinie der Cervixhöhle von vorne nach hinten, es ſcheint alſo der Kopf im geraden Durchmeſſer der Beckenhöhle, in Anbetracht der Länge des Cervix vielleicht erſt im geraden Durchmeſſer des Beckeneinganges geſtanden zu ſein; an der Cervix-Innen- und Außenwand iſt nichts Abnormes zu conſtatiren und fällt an dieſem Abſchnitte des Gebärorganes bloß die bedeutende Verdünnung auf. Der Uteruskörper ſitzt dem Cervix wie ein verkehrter Pilz, alſo mit der Schale nach oben auf und wird er durch den theilweiſe in ihm eingefchloſſenen und von dem rupturirten Uterusgrunde umſpannten kindlichen Kopfe in dieſer Configuration erhalten. Die Decke der Uteruswandung ſchwankt zwiſchen 2—3 Ctm. und ſind wenigſtens jetzt, nachdem das Präparat allerdings zehn Jahre dem Einfluffe des Weingeiſtes ausgeſetzt war, die Dimenſionen des Gebärorganes ſo gering, daß man

fragen möchte, wie es möglich war, dafs in diesem kleinen Raume ein ausgetragenes, fogar grofses und kräftiges Kind, nebst Adnaxis und Fruchtwasser Platz finden konnte — Kind (Mädchen) 50 Ctm. lang, Nabelschnur — an der Placentarinfertion abgetrennt — 67 Ctm., Placenta fehlt. Soweit möglich wurden auch die Mafse am kindlichen Schädel genommen:

Vom Kinn bis zur kleinen Fontanelle 11,5 Ctm.

Der grofse quere Durchmesser . . . 9,4 „

Der grofse fchräge Durchmesser . . 13,0 „

Kopfgeschwulst noch fehr deutlich am linken Scheitelbeine und linken oberen Hälfte des Hinterhauptbeines, doch breitet sie sich auch über die Sagittalnaht etwas nach rechts aus. Die Ränder des Risses, der die ganze Breite des Fundus durchmifst, also quer von rechts nach links geht, lassen da, wo eine Differenzirung von der Uterus-Innenfläche möglich ist, eine Dicke von 1 bis 1½ Ctm. auferdem aber keine partielle Verdünnung oder Einlagerung von Pseudoplasmen, Narben u. f. w. erkennen. Der kindliche Kopf ist bis zum Munde in die Bauchhöhle geboren und wird wie erwähnt, in seiner oberen Hälfte von Uterusubstanz umhüllt; verfolgt man prüfend zwischen zwei Fingern die Dicke der Wandung vom Cervix gegen den Fundus, so ist die Verjüngung des Dickendurchmessers unverkennbar; das Peritoneum ist in gleicher Ausdehnung mit dem Uterusparenchym durchbrochen.

Ueber die Aetiologie dieser Ruptur wissen wir nun leider nichts Gewisses, doch weist die Verlängerung und Verdünnung des Cervix, auch die jetzt noch deutlich erkennbare Kopfgeschwulst auf ein stattgehabtes mechanisches Geburtshindernifs hin; auch scheint die Stellung der Frucht eine fehlerhafte gewesen zu sein, indem der Sagittaldurchmesser des kindlichen Schädels im geraden Durchmesser des Beckeneinganges gestanden sein mufs, nach der jetzt noch bestehenden Einstellung des Kopfes in den Cervicalschlauch, doch wollen wir auf letzteres nicht zu viel Werth legen.

Was nun die Veranlassung bot, daß der Uterus im Fundus zerrissen ist, ist schwer zu beurtheilen:

Wir haben es zu thun mit einer spontanen Ruptur des Grundes bei ganz normalem Gewebe, zu einer Zeit, da die Eröffnungsperiode ihr Ende erreicht hat, wie die Cervix-Verhältnisse zeigen, auch handelt es sich vermuthlich um eine Erstgeburt — ebenfalls aus der Beschaffenheit des unteren Cervixabschnittes ersichtlich, und der Uteruskörper scheint in seinen Dimensionen verkleinert, verkürzt. Bei dem Geburtshergange findet nun normal durch die Wehenthätigkeit eine Streckung des Fruchtkörpers statt und bilden oberes und unteres Fruchttende die beiden Pole der Fruchtaxe, auf welche in radiärer Richtung die Expulsivkräfte des Gebärgorganes wirkend gedacht werden müssen; durch dieselben wird nun die Axe in leicht drehender Bewegung nach der Seite des geringeren Widerstandes, bei normaler Geburt also des Poles A vorgeschoben, während der Pol B den Hauptangriffspunkt für die austreibenden Kräfte bildet, folglich auch den größten Gegendruck gegen die Uteruswand ausübt, der bei einer gewissen Höhe doch zu einem gewissen Grade von Dehnung und Ausbuchtung des Gewebes führen muß. Stehen nun dem Pole A, der gegen die natürliche Oeffnung des Uterusraumes gerichtet ist, einerseits in dem verengten Becken andererseits in der Elasticität und Unzerreißlichkeit des Halstheiles zu große Hindernisse entgegen, sowohl sich den natürlichen Weg für seinen Durchtritt, als einen neuen zu bahnen, so ist nicht recht einzusehen, warum man die Möglichkeit, daß sich Pol B eine Passage nach seiner Richtung eröffnen könne, abstreiten sollte — für den Fall, daß die austreibenden Kräfte nachhaltig genug sind. Es muß also in einem solchen Falle angenommen werden, daß sich Pol B id est oberes Fruchttende durch allmähliche Verdünnung und schließliche Continuitätstrennung des Uterusgrundes Luft machen kann, überhaupt, daß eine spontane Ruptur des Uterusgrundes bei normalem Gewebe möglich ist; eine Verkürz-

ung des Uterus in der Längsaxe wird das Zustandekommen dieses Ereignisses begünstigen. Dafs aber hier der Cervix so nachdrücklich Widerstand leistete, ist in dem Umfande zu suchen, dafs er noch nie eine Dehnung und Zerrung durch frühere Geburten erfahren hatte.

ad 5) Wir haben bei der Eintheilung der Rupturen nach Urfachen der violenten Ruptur erwähnt und kommt dieselbe in gerichtlich-medicinischer Beziehung in Betracht. Es ist allerdings ein etwas deprimirendes Bewuststsein für den Arzt, nachdem er nach bestem Wissen Mühe und Zeit aufgewendet, sich schliesslich noch vor den Schranken des Gerichtes verantworten zu müssen und dadurch gar häufig seinen Ruf untergraben, seine Stellung gefährdet zu sehen, und ist es gar nicht zu wundern, wenn man selbst von sonst ganz gewissenhaften Aerzten die Aeufserung hören kann, „sie würden sich hüten, in solch' verzweifelten Fällen Hilfeleistung zu versuchen in der Erwägung, sich die Gefährlichkeit eines unglücklichen Ausganges und die Folgen einer möglichen peinlichen Untersuchung zu ersparen“; indess läst sich gegen das Gesetz nicht rechten und ist der beste Schutz gegen solche unangenehme Erfahrungen jedenfalls nur in der genauen Erkenntniss, die man erlangt durch eine gewissenhafte Untersuchung und in der richtigen Würdigung der gegebenen Verhältnisse gelegen. Auf der anderen Seite ist es nicht zu leugnen, dafs unvorsichtige, kunstwidrige Hilfeleistung das Ereigniss einer Ruptur herbeiführen kann, welches vielleicht bei Waltung kunstfertigerer Hand vermieden worden wäre; so kann durch Eindringen der Hand in den Uterus zum Zwecke der Wendung auf die Füsse eine Ruptur erfolgen durch plötzliche Vermehrung des Inhaltes; häufiger sind noch, veranlasst durch gewaltsame Applikation der Zange und Entbindungsversuche, Verletzungen des Cervix, von welchen aus sich die Continuitätstrennung fortsetzen kann. Wie schwer es aber oft ist zu entscheiden, ob die Schuld am Arzte oder an der Constellation der natürlichen Verhältnisse liegt, möge ein

Fall beweisen, den von Hecker *) veröffentlicht und den ich zum Ende fragmentarisch anzuführen mir erlaube:

Ein Arzt wurde Abends zu einer Drittgebärenden gerufen, die das erste Mal nach mißlungenem Zangenversuche durch Wendung von einem todtten Kinde entbunden worden war und das zweite Mal eine spontane Frühgeburt durchgemacht hatte. Der Arzt traf die Frau wehenlos seit 8 Stunden, Fruchtwasser seit 12 Stunden abgeflossen, Unterleib empfindlich, Gesichtszüge verfallen, Puls schwach frequent, Patientin voll Angst und Unruhe; bei der inneren Untersuchung Muttermund über den Kopf zurückgezogen, der letztere in erster Position hoch im Beckeneingange stehend, Beckenräumlichkeit nicht ungünstig, Uterus fühlt sich schlaff an. Es wurde aus diesen Symptomen die Indication für Beschleunigung der Geburt genommen und ein Zangenversuch gemacht, bei der Einführung der Zangenlöffel Abgang von coagulirtem und flüssigem Blute, Schluss kam nicht zu Stande, und man entschloß sich zur Wendung und Extraction an den Füßen.

Beim Eingehen mit der Hand hatte der Arzt das Gefühl, als ob er mit den Fingerspitzen über einen Lappen streife — Wendung und Extraction bis auf Lösung der Arme leicht, bei letzterer vermehrter Kraftaufwand, Kopf folgte nicht den gewöhnlichen Handgriffen, auch die Anwendung der Zange, die zwar zum Schlusse gebracht wurde, mit der man aber wegen des hohen Kopfstandes keine ergiebigen Traktionen machen konnte, führte nicht zum Ziele — Abtrennung des Kopfes mit dem Federmeißel in der Hoffnung, demselben eine bessere Stellung geben zu können — auch die weiteren (Zangen)-Versuche den Kopf zu entwickeln, mißlingen, Einführung der Hand und Zug am Unterkiefer endet damit, daß die Hand mit dem abgebrochenen Unterkiefer aus der Scheide herauschnellt, Aufgeben der weiteren Entbindungsversuche in der Ueberzeug-

*) Friedreich's Blätter über gerichtliche Medicin, 20. Jahrgang. 1869, Pag. 1.

ung des baldigen Todes; der Arzt verläßt die Kranke um 11 Uhr — Tod Morgens 3 Uhr.

Es wurde Klage gegen den Arzt gestellt, und folgender Sektionsbefund an der exhumirten Leiche erhoben: Uterus nach rechts gelagert, Kindskopf mit Nachgeburt, Eihäuten und Nabelschnur in die Bauchhöhle ausgetreten; Scheidengewölbe, Gebärmutterhals und unteres Uterinsegment in der Länge von 6 Zoll und in der Breite von 3 Zoll eingerissen; Schambeinverbindung in der Höhe eines Zolles getrennt.

Das bezirksgerichtliche Gutachten hatte gelautet, daß die Frau in Folge eines Gebärmutterrisses gestorben, daß sich aber weder mit Gewißheit, noch mit Wahrscheinlichkeit behaupten lasse, ob dieser spontan oder gewaltsam entstanden sei.

Gutachten des königlichen Medicinal-Collegiums: I) Als Ursache des Todes muß die Gebärmutter-Zerreißung angesehen werden; II) es läßt sich weder mit Gewißheit noch mit irgend einem Grade von Wahrscheinlichkeit behaupten, daß der Tod durch die Eingriffe des Arztes beim Geburts-Akte oder durch Unterlassung der Anwendung weiterer Hilfen nach erfolgter Abtrennung des Kindskopfes und nach dem mißlungenen Versuche, denselben zu extrahiren verursacht worden ist, dagegen aus der Betrachtung des aus der Leiche ausgeschnittenen Beckens und der Erwägung der anamnestischen Momente constatiren, daß es sich um eine spontane Gebärmutter-Zerreißung handelt.

Das Becken ist allgemein verengt.

Beckenmaße:

Spinae ant. sup.	18,2 Ctm.
Crift. ofs. il.	25,0 „

Beckeneingang:

Conj. vera	8,9 „
Querdurchmesser	12,1 „
I. schräger Durchmesser . . .	12,1 „
II. „ „ . . .	11,7 „
Conj. diag.	9,7 „

Beckenweite:

Gerader Durchmesser . . .	10,6 Ctm.
Querdurchmesser	11,2 „
I. schräger Durchmesser . .	11,7 „
II. „ „ . . .	11,6 „

Beckenenge:

Gerader Durchmesser . . .	11,7 „
Querdurchmesser	9,9 „

Beckenausgang:

Gerader Durchmesser . . .	10,8 „
Querdurchmesser	10,1 „
Höhe der Schamfuge . . .	3,6 „

Der kindliche Kopf bietet zwar keine besonders großen Dimensionen dar, hat aber kräftige Knochen und kann auch jetzt noch nicht anders als mit dem Gesichte voran durch den Beckenkanal hindurchgeführt werden.

Das plötzliche Aufhören der Wehentätigkeit, der Abgang des geronnenen und flüssigen Blutes bei Einführung der Zangenlöffel, das leichte Gelingen der Wendung, das subjective Gefühl des operirenden Arztes beim Einführen der Hand, als streife er über einen Lappen, sprechen dafür, daß die Ruptur schon zur Thatfache geworden war, als er seine Entbindungsversuche begann.

Auf diese Constatirungen stützte sich die Rechtfertigung der Handlungsweise des betreffenden Arztes durch das königliche Medicinalcomité, indem es in der Abtrennung des Kopfes wohl eine wissenschaftlich zu verwerfende Maßnahme aber nicht ein Object für eine gerichtliche Maßregelung gegeben erklärte, das vorausgehende und nachfolgende Verfahren des Arztes aber als vollkommen korrekt bezeichnete. Die Untersuchung wurde auf dies wissenschaftliche Gutachten hin eingestellt.

V. Mayring.



